



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.257





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.257





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.257





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.257


1.6.257














GEOMETRIA
APPLICATIONVM
DEFICIENTIVM FIGVRA
DATA SPECIE.
A VCTORE
PETRO PAVLO
CARAVAGGIO
MEDIOLANENSI

In Palatina Academia Mathematicarum
scientiarum professore.



MEDIOLANI, M. DC. LIX.

Ex Typographia Archiepiscopali.
Per Bartholomæum Bidellium.

XI. CARAV.

Ad Adm. R. D. Cæsarem Zoccum vt videat, & vbi nihil obstat,
probet Inquisitor Mediolani.

Opus hoc, cui inscribitur Geometria applicationum deficientium &c. Auctore Domino Petro Paulo Carauaggio Mediolanensi in Palatina Academia meritissimo, ac peritissimo Mathematicarum professore, Ego P. Cæsar Zocchus Rector S. Ambrosij in Solariolo de mandato Reuerendissimi Inquisitoris perlegi, & typis dignum iudicaui. In quorum fidem.

Ita est P. Cæsar Zocchus qui de mandato vt sup.

Imprimatur Fr. Petrus Hyacinthus Donnellus Magister, & Inquisitor Mediolani.

Io. Paulus Mazuchellus pro Illustrissimo, & Reuerendiss. D. D. Archiepiscopo.


Franciscus Arbona pro Excellentissimo Senatu.



EXCELLENTISSIMO
SENATVI
MEDIOLANENSI.



PETRVS PAVLVS
CARAVAGGIUS
F.



*VT me suscepti operis amor fallit,
aut vestro Amplissimi Patres iu-
ditio, ob delatum publicè Mathe-
maticas profitendi munus nimium
mibi blanditus inani persuasione
ducor, ut credam hac qualiacunq;
non esse prorsus indigna, quæ sacrario vestro sistan-
tur: Nam cum unica mihi cura sit, relictis pro-
trititis, ac peruulgatis ea indagare, quæ misero scien-
tiarum fato in Veterum monumentis desiderantur,
Et in quibus præclara Illustrum huius aui Ma-
thematicorum ingenia se exercuisse non noui; Et*

licet

licet eorum decus omne aſequi non potuerim , non
improbè tamen ſperare poſſum futurum hic aliquid,
quod ſtudioſorum vota non in totum eludat ; Nam
ut alia omittam inſtitutus labor proderit ſaltem , ad
clariorem reddendum uſum inſtaurata à ſummis
viris antiquorum *Analysis* . Hæc certa , & indubi-
tata ratiocinandi lex nos in ipſa Mathematicarum
penetralia inducit , ac ſublimioribus commentatio-
nibus viam aperit : quodq; caput eſt nouarum pro-
poſitionum inueniendarum cupidos Geometrarum
libros verſandi tadio , ac veluti ergaſtulo liberat .

Has commentationes publici iuris facere in veſtro
ampliſſimo nomine auſus ſum . Nam , cum vita ul-
tra ſtatutos aui terminos prorogari non poſſit admi-
tendum eſt , ut aliquid ſuperſit , propter quod nos
vixiſſe , nec pudeat , nec peniteat . Neque feliciori-
bus auſpicijs hæ facultates principes publico uſui
inſeruire poſſunt , aut debent . Id unicum pignus erit
obſervantiæ meæ , aut potius pietatis erga vos te-
ſtandæ , ut omittam veſtra non in publicam modo ,
ſed in rem literariam ingentia merita , qui ad ornan-
das , atq; augendas diſciplinæ , earumq; cultores fo-
uendos nati eſtis . Ita munus veſtrum vobis redditum
eo , apud quos natum , atq; eductum ; ſimul Deum
veneror , ut diu talia appendere vobis poſſim , ac per-
petua veſtræ felicitatis voto damnari . Valete .

ISAGOGE.

ISAGOGÆ.



A R S ea Matheſeos , quæ iactis communium Elementorum fundamentis ſublimior, ac plena Maieſtatis exurgit , & prope perfecti operis faſtigium extollit ; dum ſcilicet vim, & facultatem vnicuiq; ſubminiſtrat in Geometricis, atq; Arithmetiſis quæcunq; Problemata inueniendi, & , teſte Pappo, vocatur locus reſolutus, inuenta, ac comparata in ſuperbi illius Problematis gratiâ, NVLLVM PROBLEMA NON SOLVERE, deficiens, & quodammodo manca eſſet, niſi quando Problemata fieri poſſent, determinatio indicaret ; ſi quidem omnis cura, atq; opera fruſtra eſſet, ſi ea, quæ inueniri non poſſunt, inueſtigarentur.

Cum igitur locorum variæ ſint ſpecies ; alij enim plani, alij ſolidi, alij lineares dicuntur; & vniuſcuiuſq; ſpeciei gradum determinet applicatio magnitudinis datæ magnitudini cum defectu ſimili figuræ datæ, quæ contineat magnitudinem applicatæ magnitudini homogeneam. Plani enim loci gradum determinat applicatio ad datam rectam lineam plani deficientis parallelogrammo ſimili dato; ſolidi loci gradum determinat applicatio ſolidi ad datam lineam, vel planum datum, cum defectu parallelepipedo ſimilis dato; Linearium verò locorum maiorem lineæ virtutem oſtendit, quo altius denominatur magnitudo applicata cū homogeneo defectu ; quam denominationem nos ex Arithmetiſis in Geometriam transferemus homogeneis

A neis

neis in eodem gradu constitutis; latere scilicet cum radice; plano cum quadrato; solido cum cubo; plano plano, cum quadrato quadrato; plano solido, cum quadrato cubo; solido solido, cum cubo cubo; & sic ulterius procedendo; seruata Analyftarum Methodo Diophantea, quod antiquos fecisse non noui, aut si factum est misero scientiarum fato cum pluribus alijs est deperditum; ea enim, quæ ex ipsorum monumentis ad nos peruenerunt ad Geometriam spectantia in trina solidi dimensione terminantur, non altius ascendendo. Quamobrem plani tantum ad datam lineam applicatio deficientis parallelogramo simili dato, & solidi ad datam lineam applicatio cum defectu parallelepipedo similis dato determinata in Antiquorum monumentis reperitur. Prima in datæ lineæ bisectione maxima demonstratur ab Euclide lib. 6. prop. 27.; & secunda in trisectione ab Eutocio in Archimedē de Sphæra, & Cylindro, prop. 3., & à Bonauentura Caualerio; sed cum hic vsus sit methodo suæ Geometriæ indiuisibilibus continuatæ; & Eutocius id præstiterit ope conicarum sectionum, quarum vsus nonnullis non arridet, vt Geometricus; idè nos addemus ijs, qui nos præcesserunt, vt hanc etiam solidi applicationem in trisectione datæ lineæ maximam Geometricè determinemus, nullis adhibitis ad demonstrationem Conicis sectionibus, sed solis Euclideanis postulatis, adhibita scilicet tantum linea, & circulo; in hoc Geometriam promouentes, amplius illam promoturi in applicationibus altiorum graduum, quod in ipsis maximum sit determinando; demonstrantes quemlibet

bet gradum, vt maxima fiat applicatio tot requirere
 datæ magnitudinis sectiones, quotus ipse est in ordi-
 ne graduum; ita vt plano plani, quod quartum in ma-
 gnitudinum serie gradum obtinet, applicatio cum ho-
 mogeneo defectu, vt maxima sit, requirat magnitudi-
 nem, cui applicatur quadrifariam secari: Plano solidi
 verò applicatio cum homogeneo defectu requirat
 quintufariam secari, cum plano solidum quintum ob-
 tineat gradum in scala magnitudinum, & sic in infini-
 tum. Et tunc cum maguitudo lineæ applicabitur ac-
 cidet maxima applicatio ad vnam dictarum partium;
 cum verò applicabitur gradui altiori, tunc maxima
 applicatio continget in tot partibus datæ magnitudi-
 nis, cui fit applicatio, quota ipsa est in ordine gra-
 duum, diuisæ in tot partes, quota est applicanda ma-
 gnitudo in ordine graduum; idest magnitudinis, cui
 fit applicatio partes denominabit numerus graduum
 magnitudinis applicandæ; numerabit verò numerus
 graduum magnitudinis, cui fit applicatio. Hoc locu-
 pletemus exemplo. Applicandum sit solido solidum
 plano plano, cum defectu cubi cubi, inuestigandumq;
 quodnam maximum futurum sit, quod applicari possit,
 exurget illud fore omnium maximum, quod diuiso pla-
 no plano in sex partes applicabitur ipsius plano plani
 quatuor partibus; cum applicandum sit solido soli-
 dum, quod in ordine magnitudinum sextum gradum
 obtinet, & plano planum, cui fit applicatio in ordine
 magnitudinum obtineat quartum gradum, & reli-
 quum occupabit defectus figuræ homogeneæ similis
 datæ seruato ordine sequenti.

A 2 Maxi-

Maximum planum, quod applicatur datæ lineæ deficiens parallelogrammo simili dato est id, quod applicatur dimidio datæ lineæ; parallelogrammum simile dato deficiens adiacet alteri dimidio.

Maximum solidum, quod applicatur datæ lineæ deficiens solido simili dato est id, quod applicatur datæ lineæ tertiæ parti; solidum simile dato deficiens adiacet reliquis duabus tertijs partibus.

Maximum solidum, quod applicatur dato plano deficiens solido simili dato est id, quod applicatur dati plani duabus ex tribus partibus; & solidum simile dato deficiens adiacet reliquæ tertiæ parti.

Maximum plano planum, quod applicatur datæ lineæ deficiens plano plano simili dato est id, quod applicatur datæ lineæ parti quartæ; & plano planum simile dato deficiens adiacet reliquis tribus ex quatuor partibus.

Maximum plano planum, quod applicatur dato plano deficiens plano plano simili dato est id, quod applicatur dati plani duabus ex quatuor partibus, id est dimidio; & plano planum simile dato deficiens adiacet reliquis duabus ex quatuor partibus, id est dimidio.

Maximum plano planum, quod applicatur dato solido deficiens plano plano simili dato est id, quod applicatur dati solidi tribus ex quatuor partibus; & plano planum simile dato deficiens adiacet reliquæ quartæ parti.

Maximum plano solidum, quod applicatur datæ lineæ deficiens plano solido simili dato est id, quod applicatur datæ lineæ quintæ parti; & plano solidum simile

simile

simile dato deficiens adiacet reliquis quatuor ex quinque partibus.

Maximum plano solidum, quod applicatur dato plano deficiens plano solido simili dato est id, quod applicatur dati plani duabus ex quinque partibus; & plano solidum simile dato deficiens adiacet reliquis tribus ex quinque partibus.

Maximum plano solidum, quod applicatur dato solido deficiens plano solido simili dato est id, quod applicatur dati solidi tribus ex quinque partibus; & plano solidum simile dato deficiens adiacet reliquis duabus ex quinque partibus.

Maximum plano solidum, quod applicatur dato plano plano deficiens plano solido simili dato est id, quod applicatur dati plano plani quatuor ex quinque partibus; & plano solidum simile dato deficiens adiacet reliquæ quintæ parti.

Et sic procedendo.

Sed cum superius me ex Arithmetis in Geometriam magnitudinum denominationes transferre dixerim, qua lege id faciam, quomodo Arithmetice Geometriæ conciliem Isagogis loco docebo.


Apud Arithmeticos posita numerorum continue proportionalium serie ab unitate incipientium, primus ab unitate dicitur radix, secundus quadratus, tertius cubus, quartus quadrato quadratus, quintus quadrato cubus, sextus cubo cubus, & sic in infinitum, servata denominandi Methodo Diophantea in exponentium additione. Non incongruum igitur erit similiter in Geometria, posita linearum serie proportionali-

tionaliter continue procedentium, si prima ponatur loco unitatis, secunda dicatur Analoga radici, tertia quadrato, quarta cubo, quinta quadrato quadrato, & sic ulterius procedendo. Quia ut quadratum primæ ad quadratum secundæ, ita prima ad tertiam; & ut cubus primæ ad cubum secundæ, ita prima ad quartam; & ut quadrato quadratum primæ ad quadrato quadratum secundæ, ita prima ad quintam; & eadem Methodo ulterius procedendo. Non aliter, ac numerorum quadrata metitur unitatis quadratum, toties, quot unitates sunt in illo proportionali numero, qui tertius est incipiendo ab unitate, & continuando rationem unitatis ad latus quadrati; seu ad quem unitas habet duplicatam rationem eius, quam habet ad latus quadrati. Numerorum cubos metitur unitatis cubus toties, quot unitates sunt in illo proportionali numero, qui quartus est, incipiendo ab unitate, & continuando rationem unitatis ad latus cubi, seu ad quem unitas habet triplicatam rationem eius, quam habet ad latus cubi. Numerorum quadrato quadrata metitur unitatis quadrato quadratum, toties, quot unitates sunt in illo proportionali numero, qui quintus est, incipiendo ab unitate, & continuando rationem unitatis ad latus quadrato quadrati; seu ad quem unitas habet quadruplicatam rationem eius, quam habet ad latus quadrato quadrati; & sic deinceps.

Posita igitur quocunq; linearum $A | B | C | D | E$ continue proportionalium serie $A B C D E$, & prima gerat vicem unitatis, reliquæ reliquis magnitudinibus
homo-


homologæ erunt; euadet igitur reliquarum magnitudinum latus, seu radix B, cuius quadrato homologa erit C, & cubo D, & quadrato quadrato E.

Effingatur enim ex ipsa B quadratum; ut A ad C, ita erit A quadratum ad B quadratum; facto deinde B cubo, erit ut A ad D, ita A cubus ad B cubum; seu, ut B ad C,




ita B quadratum ad B cubum; & similiter B cubus erit ad B quadrato quadratum, ut C ad D, seu, ut A ad B; si verò B cubi altitudo formetur in ratione A ad B

ortum erit parallelepipedum, quod refert magnitudinem quadrato quadrati, quale est parallelepipedum B; si huius iterum ultimi parallelepipedi altitudo ad aliam altitudinem referatur, manente eadem basi, in eadem ratione A ad B exurget quadrato cubus &c.; & hæ magnitudines augebuntur, si ratio A ad B erit minoris ad maius, & minuentur si maioris, ad minus, ut pater.




Sit igitur data quæcunq; recta C, ex qua effingendum sit quadrato quadratum; constituenda prius erit aliqua linea, quæ se habeat loco unitatis; sit v. g. O, & sicuti O se habet B ad



ad C, ita C fiat ad aliam v. g. P, ex qua vti altitudine
constituatur parallelepipedum habens pro base ipsius
C quadratum; hoc parallelepipedum refert quadrato
quadratum quesitū, quale est parallelepipedum A B C
D E F G H, cuius basis est quadratū B E ex latere B C
equale lateri C, & altitudo B A, ad quam C habet
eam rationem, quam habet O ad C.

Si verò sit constituendus
quadrato cubus fiet paral-
lelepipedum I K L M N O
P Q, cuius basis sit quadra-
tum K N æquale quadrato
lineæ C, & altitudo sit I K,
ad quam B A altitudo scili-
cet quadrato quadrati ha-
beat rationem, quam habet
O ad C, seu ad quam C ha-
beat duplicatam rationem
eius, quam habet O ad C, id est sint continuè propor-
tionales O & C, & B A, & I K: eodem modo de reli-
quis denominatis magnitudinibus erit differendum.

Quo circa quadrato quadrata ex inequalibus lineis
ortā erunt parallelepipeda illa, quæ super datarum li-
nearum quadratis basibus constituta habebunt alti-
tudines in duplicata ratione datarum linearum:
Cum enim linea, quæ gerit vicem vnitatis ad effor-
mandum quadrato quadratum ex dato latere, super
dati lateris quadratum effingat parallelepipedū, cum
ea altitudine, ad quam habeat rationem, quæ sit du-
plicata eius, quam habet ad datum latus; habebit ad
vtriusq;



9
vtriusq; quadrato quadrati altitudinem duplicatam
rationem eius, quam habet ad ipsarum basium latera;
quare, quadrato quadratorum altitudines inter se
erunt in duplicata ratione laterum suarum basium.
Si enim sint duæ series continue proportionalium ab
eadem quantitate incipientium, habebit tertia primæ
seriei ad tertiam secundæ seriei duplicatam rationem
eius, quam habet secunda primæ seriei ad secundam
secundæ seriei; vt in lēmate secundo demonstrabimus.

Similiter quadrato cubi ex inæqualibus lineis orti
erunt parallelepipedum illa, quæ super datarum linea-
rum quadratis basibus constituta habebunt altitudines
in triplicata ratione datarum linearum; nam cum li-
nea, quæ gerit vicem vnitatis, ad efformandum qua-
drato Cubum ex dato latere, super dati lateris qua-
dratum effingat parallelepipedum cum ea altitudine,
ad quam habeat rationem, quæ sit triplicata eius,
quam habet ad datum latus, habebit ad vtriusq; qua-
drati Cubi altitudinem triplicatam rationem eius,
quam habet ad ipsarum basium latera; quare quadrato
Cuborum altitudines inter se erunt in triplicata ra-
tione laterum suarum basium. Si enim sint duæ series
continûe proportionalium ab eadem quantitate inci-
pientium, habebit quarta primæ seriei ad quartam se-
cundæ seriei triplicatam rationem eius, quam habet
secunda primæ seriei ad secundam secundæ seriei, vt
in lemme secundo demonstrabimus.

Et ex his facili negotio apparet similia plano plana
esse illa parallelepipedum, quæ super similibus basibus
cōstituta, habent altitudines in duplicata ratione late-

B rum

rum homologorum similiū basium; & similia plano solida esse illa parallelepipedā, quæ super similibus basibus constituta habent altitudines in triplicata ratione laterum homologorū similium basium; & semper iuxta numerū graduum, ad quem ascendit magnitudo denominata ultra solidum, totuplicem esse rationem altitudinum rationis laterum homologorum similium planorum, super quibus cōstructa erunt parallelepipedā.

His præmissis, ut transeamus ad applicationes magnitudinis magnitudini cum homogeneo defectu simili figuræ datæ, hoc nihil aliud erit, quam ita secare magnitudinem datam, cui fieri debet applicatio, ut si ex altero segmento gignatur figura similis datæ, quæ defectura sit, quod sit ex ortiuo latere in reliquum datæ magnitudinis segmentum æquetur applicandæ magnitudini; ortiui autem lateris nomine non tantum lineam, sed etiā superficiem intelligo. Si enim datæ lineæ applicandum sit solidū solido æquale deficiens Cubo, vel quocunq; solido parallelepipedo simili dato, hoc nihil aliud erit, quam ita datam lineam secare, ut si ex altera ipsius parte effingatur parallelepipedum simile dato, quod ex altera efficti parallelepipedi superficie, tanquam basi, & reliquo datæ lineæ segmento tanquam altitudine effingi poterit parallelepipedum, æquetur solido, dato; & in huiusmodi casu latus exurgens est superficies. Si vero dato plano applicandum esset solidum solido æquale deficiens Cubo, vel quocunque parallelepipedo simili dato, ita secandum esset planum, ut si ex latere alterius segmenti in quadratum efformati, ut effingatur Cubus, vel in
paralle-

parallelogrammum simile dato, ut ductum in altitudinem similem datæ exurgat parallelepipedum simile dato, quod ex hac altitudine in reliquum plani efficitur solidum sit æquale solido dato, & in huiusmodi casibus latus exurgens est linea.

Cum autem data magnitudo ita secari possit, ut si ex altero segmento effingatur figura similis datæ, quod ex ortiuo huiusce figuræ latere sit in reliquum magnitudinis segmentum sit omnium maximum; nostrum obiectum erit datæ magnitudinis sectionem determinare, idq; Geometricè.

Et quia nouam mihi videor esse viam ingressus operæ pretium me facturum existimaui si non solum inuenta demonstrarem Theoremata, sed Methodum etiam, quæ usus sum in inueniendo adderem, ut in commune commodum hæc veluti exempla prodirent ad facultatem unicuiq; comparandam similia, & subtiliora excogitandi, ac demonstrandi; quare in singulis propositionibus præmittam prius Analysim Zeteticam, seu inuentricem, qua determinatam sectionem inueni, ubi figura deficiens sumetur e serie scalarium magnitudinum; nam planum deficiens erit quadratum, solidum deficiens Cubus, plano planum deficiens quadrato quadratum, & sic de cæteris; cum ut æqualitas laterum in proportionem transferatur solum maior operæ non peritia requiratur; huic Subdam Poristicen, qua examinetur inuentum posito solido deficienti solido quocunq; simili dato, quod tandem sequetur demonstratio Synthetica circa ipsas Geometricas magnitudines.

Et quia unicuique lateri, aut figuræ potest dari linea homologa; si constituatur linea, quæ se habeat loco unitatis, poterit etiam dari homologa producto ex altero datæ magnitudinis segmento in homologam lateri ortiuo ex applicatione deficientis figuræ reliquo segmento, quæ, ut sit omnium maxima, determinanda erit datæ magnitudinis sectio, quam determinabimus adhibitis in demonstrationem, non ut superius ipsis magnitudinibus, sed lineis proportionalibus, quæ ipsis magnitudinibus homologæ sint; ita ut in id recidat hæc Methodus, ut posita linea non secta hæc se habeat loco unitatis, & similis sit ei, quæ ab Euclide dicitur rationalis, cui, vel cuius potestati reliquæ comparentur, & magnitudo, cui fieri debet applicatio ita secetur, ut si alterum segmentum fiat ad aliud, ut non secta gradus homogeneus lateri, quod resultat ex effectione figuræ similis datæ ab altero segmento in unum effingendæ figuræ latus efformato ad idem latus, id, quod resultat sit omnium maximum.

Id dilucidemus exemplis. Sit docendum cum Euclide lib. 6. propositione 27., maximum planum, quod applicari possit lateri dato deficiens quadrato esse id, quod ad dimidium dati lateris applicatur; quod idem est, ac rectangulum, quod fit sub dati lateris segmentis æqualibus esse omnium maximum. Iuxta hanc methodum in id recidet, ut data quadam non secta datum latus ea lege secetur, ut si fiat, ut non secta ad unum segmentum, ita alterum segmentum ad aliud, id demonstretur omnium maximum, quod exurget si datum latus bifariam secetur.

Sit

Sit quærendum maximum solidum, quod applicari possit dato lateri cum defectu Cubi, quod esse id, quod applicatur tertiæ parti dati lateris demonstrat Euto-
cius in Archimedes de Sphæra, & Cylindro lib. 2. propositione 3., vbi docet, proposita linea, eaq; secta, ita vt partes sint in ratione dupla, parallelepipedum constructum base quadrato maioris partis, & altitudine minori portione, maximum esse omnium, quæ pariter confici possint ex alia quacunq; sectione eiusdem lineæ. Hac autem methodo in id recidet, vt posita linea non secta datum latus ita secetur, vt si fiat, vt non secta ad alterum segmentum, ita alterius segmenti quadratum ad aliud, hoc doceatur esse omnium maximum, quando segmentum, ex quo fit quadratum est duplum alterius segmenti, vel alterum segmentum est æquale tertiæ parti dati lateris; & vt etiam omnia ad lineas tantum reducantur, iuxta hanc methodum, in hanc formam exprimi poterit. Datis duabus rectis lineis, quarum altera sit non secta, altera vero secta, & alterum segmentum sectæ habeat ad aliam lineam rationem duplicatam eius, quam habet non secta ad alterum segmentum, hanc lineam fore omnium maximam, quando segmentum, ad quod refertur non secta erit æquale duabus tertijs partibus datæ rectæ.

Sit quærendum maximum solidum, quod applicari possit dato plano cum defectu Cubi, quod à nobis demonstrabitur esse id, quod applicatur duabus tertijs partibus dati plani, idq; Geometricè; vbi, quia defectus debet assimilari Cubo, necesse erit alterum dati plani segmentum in quadratum effingi: quare in id re-
cidet

cidet hæc methodus, vt si fiat, vt data non secta ad similem lateri quadrati dati segmenti, ita similis residuo plani ad aliam, quæ similitudo sit respectu datæ non sectæ vti rationalis; & erit quæ exurget quarto loco proportionalis posita Proportionalium prima non secta, secunda similis lateri quadrati, tertia similis longitudini, quæ oritur ex applicatione reliqui segmenti ad idem latus.

Sed ad hæc, dilucidanda non inutile erit pauca subnectere; hoc est cum superius dixerimus scalaribus magnitudinibus dari posse proportionales rectas lineas homologas in serie continuè proportionalium, quarum prima gerat vicem vnitatis, secunda lateris, seu radicis; hinc colligi posse magnitudinum additioni, aut subtractioni respondere solam linearum homologarum additionem, & subtractionem, & magnitudinum ductui, & applicationi respondere solam cuiusdam proportionalis inuentionem, quæ duas datas, vti tertia sequatur, aut tres datas vti quarta. Cum enim numerum per numerum multiplicare idem sit, ac reperire numerum, ad quem multiplicatus habeat eam rationem, quam habet vnitas ad multiplicantem; & id circò quatuor fiant numeri proportionales, vnitas, & multiplicans, multiplicatus, & productus; similiter cum ducenda sit Geometrica magnitudo in magnitudinem, & Geometricis magnitudinibus possint exhiberi lineæ homologæ; si determinetur quædam linea, quæ habeat se loco vnitatis, & ponatur prima proportionalium, & secunda proportionalium sit linea alteri magnitudinum ducendarum homologa; & fiat, vt linea

nea

nea posita loco vnitatis ad hanc secundam, ita altera
 linea homologa alteri Geometricæ magnitudini ad
 aliam; hæc ultimo loco inuenta similis erit ei, quod fit
 ductis inter se dictis magnitudinibus. Id doceamus
 exemplo. Sit ducendum B quadratum in C Cubum;
 posita linea A quæ se hebeat loco vnitatis, si fiat, vt
 A ad B latus quadrati ita B ad aliam v. g. D, erit D
 similis B quadrato; item si fiat, vt A ad C, ita C ad E,
 & E ad F, erit F similis C Cubo; si tandem fiat, vt
 A ad D ita F ad aliam, quæ sit G, erit G similis pro-
 ducto ex B quadrato in C Cubum.

In diuisionibus vero numerorum cum sit vt diuisor
 ad vnitatem, ita diuidendus ad quotientem, vel vt di-
 uisor ad diuidendum, ita vnitatis ad quotum. Similiter
 in applicationibus magnitudinum, cum possint, & ap-
 plicandis, & ijs, quibus fit applicatio magnitudinibus
 assignari lineæ homologæ, posita linea rationali, quæ
 vicem gerat vnitatis; si fiat, vt similis ei, cui fieri debet
 applicatio, ad eam, quæ similis est applicandæ; ita li-
 nea, quæ se habet loco vnitatis ad aliam, exurget si-
 milis quoto. Sit applicandus B Cubus C quadrato.
 Posita linea A pro vnitatis, si fiat, vt A ad B, ita B ad
 D, & D ad E; erit E similis B Cubo; si verò fiat, vt
 A ad C ita C ad F; erit F similis C quadrato. Si
 igitur fiat vt F ad E, ita A ad aliam, hæc erit similis
 latitudini oriundæ ex applicatione B Cubi ad C qua-
 dratum.

Et radicum extractioni, quæ quædam species est
 diuisionis, respondebit inuentio medio loco propor-
 tionalium inter duas, quarum prima sit loco vnitatis;

&

& altera homologa sit magnitudini, cuius radix sit inuenienda; radix enim quadrati erit medio loco proportionalis, & radix Cubi erit prima duarum medio loco proportionalium, & radix quadrato quadrati erit prima trium medio loco proportionalium, & sic de cæteris.

Et hæc mihi Elementa non scribenti ad intelligenda ea, quæ subsequenter satis perspicuè dicta sint ijs, qui iam non Elementorum tantum, sed Geometricæ Analysis fundamenta sibi substruxerunt; cum horum rudibus, hæc futura sint obscuriora. Quare ad opus propositum Geometrica methodo prosequendum proponam terminorum definitiones, quæ ex hoc Isagogico prolegomene manifestæ satis erunt.



DEFL.

DEFINITIONES.

I.



Lano plana similia voco parallelepipedum illa, quæ super similibus parallelogrammis basibus constituta habent altitudines in duplicata ratione homologorum laterum similium basium, vel in ratione basium, vel in ratione subsestuplicata similium solidorum.

II.

Plano solida similia voco parallelepipedum illa, quæ super similibus parallelogrammis basibus constituta habent altitudines in triplicata ratione homologorum laterum similium basium, vel sestuplicata similium basium, vel in ratione similium solidorum super similibus basibus constitutorum, vel in ratione subsestuplicata similium plano planorum.

III.

Solido solida similia voco parallelepipedum illa, quæ super similibus parallelogrammis basibus constituta habent altitudines in quadruplicata ratione laterum homologorum similium

C

basium

LBM

basium, vel duplicatam basium, vel sesquitriplicatam similium solidorum super similibus basibus constitutorum, vel in ratione similium plano planorum super similibus basibus constitutorum, vel in ratione subsesquiquadruplicata similium plano solidorum.

Et ex his patent altiorum magnitudinum similium definitiones.

IV.

Linea cui, vel cuius potestati reliquas magnitudines comparabo à me vocabitur rationalis.

V.

Si fuerint quatuor magnitudines continuè proportionales, ratio primæ ad quartam à me dicitur sesquuplicata eius, quam habet prima ad tertiam; & ratio primæ ad tertiam à me dicitur subsesquuplicata eius, quam habet prima ad quartam; similiter si fuerint quinque continuè proportionales, ratio primæ ad quintam à me dicitur sesquitriplicata eius, quam habet prima ad quartam, & ratio primæ ad quartam subsesquitriplicata eius, quam habet prima ad quintam, & sic de cæteris.

LEM-

LEMMA.

LEMMA I.

Si prima magnitudo ad secundam habu-
erit maiorem rationem, quam tertia ad quar-
tam, erit factum sub prima, & quarta ma-
ius facto sub secunda, & tertia.



Abeat prima A ad secun-
dam B maiorem rationem,
quam tertia C ad quartam
D. Dico factum ex A in D su-
perare factum ex B in C.

A
B
C
D
E

Fiat, ut A ad B, ita C ad E, habebit C ad
E maiorem rationem, quam ad D; ergo D superabit
E; ergo factum ex A in D superabit factum ex A in
E; sed factum ex A in E est æquale facto ex B in C;
ergo factum ex A in D superat factum ex B in C; &
hoc argumentum semper eadem vi concludet si A, &
B sint lineæ, C verò, & D sint plana, vel corpora, vel
plano plana, aut è contra.

LEMMA II.


Si sint duæ series continuè proportionalium
ab eadem magnitudine incipientium, ha-
bebit tertia primæ seriei ad tertiam secundæ
seriei duplicatam rationem eius, quam ha-
bet secunda primæ seriei ad secundam se-

C 2 cundæ

cundæ seriei ; & quarta ad quartam tripli-
catam, quinta ad quintam quadruplicatam,
& sic in infinitum .



Int ab eadem A duæ series continuè pro-




portionalium ABCDE, & AFGHI. Dico C ad G
habere duplicatam rationem eius, quam habet B ad F,
& D ad H triplicatam, & E ad I quadruplicatam, &
sic procedendo .

Quia ut C ad G, ita factum sub A, & C ad fac-
tum sub A, & G, idest B quadratum ad F quadra-
tum; sed B quadratum ad F quadratum habet du-
plicatam rationem lateris B ad F; ergo C ad G habet
duplicatam rationem B ad F; sed cum factum ex B in
C ad factum ex F in G habeat rationem compositam
ex ratione B ad F, & ratione C ad G, idest duplica-
ta ipsius B ad F, idest triplicatam ipsius B ad F; &
facto B in C æquetur factum ex A in D; facto vero ex
F in G factum ex A in H, habebit factum ex A in D ad
factum ex A in H, idest D ad H rationem triplicatam
B ad F; similiter argumentabimur de cæteris .

LEM-

L E M M A III.

Si ab inæqualibus quantitatibus æqualia detrahantur, habebit minor ad maiorem maiorem rationem, quam minus residuum ad maius residuum; & conuertendo maior ad minorem minorem rationem, quam maius residuum ad minus residuum.

 Int inæquales quātitates $A \text{ --- } E \text{ --- } B$
 $B \text{ --- } G \text{ --- } F \text{ --- } D$
 B minor, & C D maior, à quibus detrahantur æquales E B, & F D. Dico A B ad C D habere maiorem rationem, quam A E ad C F, & C F ad A E maiorem, quam C D ad A B.

Fiat vt A B ad C D, ita E B ad aliam, quæ erit maior, quam F D, quia C D superat A B; sit hæc D G; erit vt A B ad C D, ita A E ad C G; sed A E ad C G habet maiorem rationem, quam ad C F; ergo A B ad C D habet maiorem rationem, quam A E ad C F; & conuertendo C D ad A B habebit minorem rationem, quam C F ad A E, quod erat probandum.


L E M M A IV.

Si inæqualibus quantitatibus æqualia addantur, habebit minor ad maiorem minorem rationem, quam minor cum adiecta ad maiorem cum adiecta, & conuertendo maior cum adiecta ad minorem cum adiecta habebit

Quia DE ad EB habet maiorem rationem, quam ad DB, & componendo DB ad EB habebit maiorem rationem, quam DE plus DB ad DB, idest AE ad AD, & permutando DB ad AE habebit maiorem rationem, quam EB ad AD, quod erat probandum.

LEMMA VI.

Si recta linea secetur primo in duo segmenta, quorum alterum alterius sit duplum, secundo in duo alia quæcunq; segmenta; habebit minus segmentum primæ sectionis, ad segmentum secundæ sectionis sibi inæquale maiorem rationem, quam sit ratio duplicata alterius segmenti secundæ sectionis, ad maius segmentum primæ sectionis.

Sit recta OM secta primo in B; ita ut OB sit  dupla ipsius BM; secundo utcunq; in E. Dico BM minus segmentum primæ sectionis ad EM segmentum secundæ sectionis sibi inæquale habere maiorem rationem, quā sit ratio duplicata OE ad OB.

Sit ut OE ad OB, ita OB ad F; erit ratio OE ad F duplicata ipsius OE ad OB. Dico BM ad EM habere maiorem rationem, quam OE ad F.

Sit prius OE maior, quam OB; erit etiam F maior quam OB minus BE; nam cum OE, & OB, & F sint continuè proportionales, erit OE plus F maior duplici OB,

ci OB ; dempto OB communi, erit BE plus F maior
 OB ; ab utraq; dematur BE , erit F maior OB , minus
 BE ; ergo OE ad OB minus BE habebit maiorem ra-
 tionem, quam ad F . Tum sic, quia BM ad EM est,
 uti dupla ipsius BM ad duplam ipsius EM , idest uti
 OB ad OB minus duplici BE ; si utriq; termino ad-
 datur BE , habebit, per quartum Lemma, BM ad EM
 maiorem rationem, quam OE , ad OB minus BE , sed
 OE ad OB minus BE habet maiorem rationem,
 quam ad F : ergo BM ad EM multo maiorem ratio-
 nem habebit, quam OE ad F , idest, quam sit duplica-
 ta ratio ipsius OE ad OB , quod erat probandum.

Sit secundo OB maior ipsa OE , & facta sit ut OE
 ad OB , ita OB ad F ; erit etiam F maior, quam OB
 plus BE ; quia OE plus F superat duplam ipsius OB ,
 & dupla ipsius OB est æqualis OE , una cum OB
 plus BE ; si dematur communis OE , erit F maior OB
 plus BE ; ergo OE ad OB plus BE habebit maiorem
 rationem, quam ad F . Tum sic quia BM ad EM est,
 ut dupla BM ad duplam EM , idest, ut OB ad OB
 plus 2 BE ; si utriq; dematur idem BE , remanebit OE ,
 & OB plus BE ; quare BM ad EM habebit maiorem
 rationem, quam OE ad OB plus BE , per Lemma ter-
 tium; ergo multo maiorem, quam OE ad F , idest
 quam sit ratio OE ad OB duplicata.

LEMMA VII.

Si recta linea secetur in duo segmenta, quo-
 rum alterum alterius sit duplum, secundo
 in duo alia segmenta quæcunque, habebit
 minus

minus segmentum primæ sectionis ad medio
loco proportionalem inter minus segmentum
primæ sectionis, & alterum segmentum secun-
dæ sectionis minori segmento primæ sectionis
inæquale maiorem rationem, quam alterum
segmentum secundæ sectionis ad maius segmen-
tum primæ sectionis; vel erit ratio subduplicata
minoris segmenti primæ sectionis ad segmen-
tum secundæ sectionis sibi inæquale maior ratio-
ne alterius segmenti secundæ sectionis ad maius
segmentum primæ sectionis.

S It data recta B A, quæ prius diuidatur $\frac{G}{E A}$
in M, ita vt M A sit $\frac{B E M}{E A}$
ipſius B M dupla, deinde vtcunq; in E; & fiat,
vt B M ad G, ita G ad B E. Dico B M minus segmen-
tum primæ sectionis ad G medio loco proportionalem
inter minus segmentum primæ sectionis, & segmen-
tum secundæ sectionis ipſi minori segmento primæ se-
ctionis inæquale habere maiorem rationem, quā A E
alterum segmentum secundæ sectionis ad A M maius
segmentum primæ sectionis.

Sit primo B E minor, quam B M. Quia, vt B M ad G,
ita G ad B E; erit G minor dimidia ſumma extremarū,
ideſt B M minus dimidia E M; quare B M ad G habe-
bit maiorem rationem, quam ad B M, minus dimidia
E M, ideſt, quam dupla ipſius B M ad duplam ipſius
B M minus E M, ideſt quam A M ad A M minus E M;
ſed A M ad A M minus E M habet maiorem rationem,
D quam

quam AM plus EM , idest AE ad AM , per lemma quartum; ergo BM ad G multò maiorem rationem habebit, quam AE ad AM , quod erat probandum.

Sit secundo BE maior, quam BM . Quia ut BM ad G , ita G ad BE ; erit G minor dimidia summa extremarum, idest quam BM plus dimidia EM ; quare BM ad G habebit maiorem rationem, quam ad BM , plus dimidia EM , idest quam dupla ipsius BM ad duplam ipsius BM plus EM , idest quam AM ad AM , plus EM ; sed AM ad AM , plus EM habet maiorem rationem, quam AM minus EM , idest AE ad AM , per lemma tertium; ergo BM ad G multo maiorem rationem habebit, quam AE ad AM , quod erat probandum.

LEMMA VIII.

Si recta linea secetur primo in duo segmenta, quorum alterum alterius sit triplum, secundo in duo alia quæcunq; segmenta; habebit minus segmentum primæ sectionis ad segmentum secundæ sectionis sibi inæquale maiorem rationem, quam sit ratio triplicata alterius segmenti secundæ sectionis ad maius segmentum primæ sectionis.

S It recta AB secta primo A E M E B
 in M ; ita ut AM sit tripla F
 ipsius MB ; secundo secta ut G
 cunq; in E . Dico BM minus segmentum primæ sectionis
 ad EB segmentum secundæ sectionis sibi inæquale
 habere

habere maiorem rationem, quam sit ratio triplicata
 AE ad AM .

Cum EB possit esse, vel maior, vel minor, quā BM .
 Sit primo minor; & fiant quatuor continuè propor-
 tionales AE , & AM , & F , & G ; ita ut sit, ut AE ad
 AM , ita AM ad F , & F ad G ; erit ratio AE ad G
 triplicata ipsius AE ad AM ; & erit AE , plus G ma-
 ior, quam AM plus F ; & AE plus F superabit du-
 plam AM ; & dempto vtrinq; communi AM , erit EM
 plus F maior, quam AM ; & si vtrinq; dematur EM ,
 erit F maior, quam AM minus EM ; sed AE plus G
 maior est, quam AM plus F , dempto vtrinq; communi
 AM , erit EM plus G maior, quam F ; Ergo EM plus
 G multò magis superabit AM minus EM ; & si vtrinq;
 dematur EM , erit G maior, quam AM minus dupla
 EM . Quare AE ad AM minus dupla EM habebit
 maiorem rationem, quam ad G , idest quam sit tripli-
 cata ratio ipsius AE ad AM . Tum sic, quia BM ad
 BE est uti tripla BM ad triplam BE ; sed triplæ BM
 est æqualis AM ; ergo BM ad BE erit, ut AM ad tri-
 plam BE ; si vtriq; termino AM , & triplæ BE adda-
 tur eadem ME , habebit, per lemma quartum, AM ad
 triplam BE maiorem rationem, quam AE ad triplam
 BE , plus EM , idest ad AM minus dupla EM . Quare
 BM ad BE habebit maiorem rationem, quam AE
 ad AM minus dupla EM ; sed demonstratum est AE
 ad AM minus dupla EM habere maiorem rationem,
 quam sit ratio triplicata ipsius AE ad AM ; ergo BM
 ad BE habebit multò maiorem rationem, quam sit
 ratio triplicata AE ad AM ; quod erat probandum.

D 2

Sit

Sit secundo EB maior, quam BM. Dico BM ad E B habere maiorem rationem, quam sit ratio triplicata AE ad AM; Nam factis iterum quatuor continuè proportionalibus, quarum prima sit AE, & secunda AM, erit quarta illa, ad quam AE habebit rationem triplicatam eius, quam habet ad AM; & quia AM est æqualis triplæ BM, & AE est æqualis triplæ BM minus EM, & BE est æqualis BM, plus ME. Dico BM ad BM plus ME habere maiorem rationem, quam sit ratio triplicata, quam habet tripla BM, minus EM ad triplam BM. Fiat enim ut BM ad BM plus ME, ita tripla BM minus EM ad aliam, exurget $3 \text{ BM plus } 2 \text{ ME minus } \frac{\text{ME quadrato}}{\text{BM}}$, quæ minor erit quarta proportionali in serie continuè proportionalium, quarum prima sit $3 \text{ BM, minus ME, \& secunda } 3 \text{ BM}$; nam tertia erit $\frac{9 \text{ BM quadrata}}{3 \text{ BM minus ME}}$, & quarta erit $\frac{27 \text{ BM Cubi}}{3 \text{ BM quadratis minus } 6 \text{ BM in ME plus ME quadrato}}$, quæ superabit $3 \text{ BM plus } 2 \text{ ME, minus } \frac{\text{ME quadrato}}{\text{BM}}$, & id circò ad hanc 3 BM, minus EM habebit maiorem rationem, quam ad quartam proportionalem inuentam; sed 3 BM minus EM ad $3 \text{ BM, plus } 2 \text{ ME minus } \frac{\text{ME quadrato}}{\text{BM}}$ habet per constructionem eam rationem, quam habet BM ad BM, plus ME, idest BE; ergo BM ad BE habet maiorem rationem, quam sit ratio AE ad AM triplicata. Quartam vero proportionalem inuentam, idest $\frac{27 \text{ BM Cubi}}{9 \text{ BM quadratis minus } 6 \text{ BM in ME plus ME quadrato}}$ superare $3 \text{ BM, plus } 2 \text{ ME minus } \frac{\text{ME quadrato}}{\text{BM}}$ ex sequentibus patebit; nam si utraq; pars ducatur in $9 \text{ BM quadrata minus } 6 \text{ BM in ME plus ME quadrato}$, prima pars erit æqualis 27 BM cubis , & secunda pars erit æqualis 27 BM cubis ,

cubis, minus $18 \text{ B M in M E quadratum plus } 8 \text{ M E}$
 cubis minus $\frac{\text{M E quadrato quadrato}}{\text{B M}}$; & si fiat Antithesis, &
 demantur communia, prima pars erit æqualis 18 B M
 in $\text{M E quadratum plus } \frac{\text{M E quadrato quadrato}}{\text{B M}}$, & secunda pars
 erit æqualis 8 M E cubis ; & si vtraq; pars ducatur
 in B M , & applicetur M E quadrato , erit prima pars
 æqualis $18 \text{ B M quadratis plus M E quadrato}$; &
 secunda pars æqualis 8 B M in M E ; primam autem
 partem superare secundam patet; nam si M E finga-
 tur, vt sit omnium maxima, etiam secunda pars erit om-
 nium maxima; sed cum, vt sit maxima, licet possit supe-
 rare duplam B M , tamen debeat deficere à tripla B M ;
 constituatur æqualis duplici B M , plus A ; ita tamen
 vt B M superet A , erit prima pars, facta interpreta-
 tione, æqualis $22 \text{ B M quadratis plus } 4 \text{ B M in A}$
 plus A quadrato , & secunda pars erit æqualis 16 B M
 quadratis plus 8 B M in A , & demptis communibus,
 erit prima pars æqualis $6 \text{ B M quadratis plus A qua-}$
 drato, & secunda pars erit æqualis 4 B M in A ; cum
 autem B M superet A , & prima pars superabit se-
 cundam. Quare euidentis erit conclusio B M ad B E
 habere maiorem rationem, quam sit ratio triplicata
 A E ad A M , quod erat demonstrandum.

LEMMA IX.

Si fuerint quatuor magnitudines continuè
 proportionales aggregatum duplæ maximæ
 cum minima superabit triplam mediam
 maiorem, & aggregatum duplæ minimæ
 cum

cum maxima superabit triplam mediam
minorem.

SIt vt A ad B, ita B ad C, & C ad D, & sit
A maxima, & D minima. Dico primo ag-
gregatum duplæ A cum D superare triplam
B; Quia A plus D superat B plus C, & A plus C su-
perat duplam B, erit aggregatum ex duplici A, plus
D plus C maius aggregato ex tripla B plus C, & si
dematur communis C erit dupla A plus D maior
triplici B, quod erat probandum.

Dico secundo aggregatum duplæ D cum A supe-
rare triplam C. Quia D plus A superat B plus C,
& D plus B superat duplam C, erit aggregatum ex
duplici D plus A plus B maius aggregato ex triplici
C plus B, & dempto communi B, erit aggregatum ex
duplici D plus A maius triplici C, quod erat demon-
strandum.

L E M M A X.

Si recta linea secetur in duo segmenta, quo-
rum alterum alterius sit triplum, secundo in
duo alia segmenta quæcunq; habebit mi-
nus segmentum primæ sectionis ad primam
duarum medio loco proportionalium inter
minus segmentum primæ sectionis, & al-
terum segmentum secundæ sectionis minori
segmento primæ sectionis inæquale maio-
rem rationem, quam alterum segmentum
secundæ

secundæ sectionis ad maius segmentum primæ sectionis ; vel erit ratio subtriplicata minoris segmenti primæ sectionis ad segmentum secundæ sectionis sibi inæquale maior ratione alterius segmenti secundæ sectionis ad maius segmentum primæ sectionis ; Vel maius segmentum primæ sectionis ad segmentum secundæ sectionis sibi inæquale habebit maiorem rationem , quam sit ratio primæ duarum medio loco proportionalium inter minus segmentum primæ sectionis , & alterum segmentum secundæ sectionis ad minus segmentum primæ sectionis ; idest quam sit ratio subtriplicata alterius segmenti secundæ sectionis ad minus segmentum primæ sectionis ; eadem enim est semper propositio .



It data recta B A, $\frac{A}{F} \frac{E}{G} \frac{M}{E} \frac{B}{B}$
 quæ primo diuidatur in M, ita vt M A $\frac{A}{F} \frac{E}{G} \frac{M}{E} \frac{B}{B}$
 fit ipsius B M tripla, deinde vteunq; in E, & inter B M, & B E supponantur duæ mediæ proportionales G, & F; ita vt sit, vt B M ad G, ita G ad F, & F ad B E . Dico B M minus segmentum primæ sectionis ad G primam medio loco proportionalium inter B M minus segmentum primæ sectionis, & B E segmentum secundæ sectionis ipsi B M inæquale habere

bere maiorem rationem, quam $A E$ alterum segmentum secundæ sectionis ad $A M$ maius segmentum primæ sectionis; & è contra $A M$ maius segmentum primæ sectionis ad $A E$ segmentum secundæ sectionis sibi inæquale habere maiorem rationem, quam G ad $B M$, idest, quam $B E$ ad F , idest, quam sit ratio subtriplicata $B E$ alterius segmenti secundæ sectionis ad $B M$ minus segmentum primæ sectionis.


Sit primo $B E$ minor, quam $B M$, erit, per superius lemma, dupla $B M$ plus $B E$ maior, quam tripla G , & quia $B M$ est æqualis $B E$ plus $E M$, erit tripla $B M$ minus $E M$ maior, quam tripla G ; & si vtriusq; partis sumatur pars tertia, erit $B M$ minus tertia parte $E M$ maior G . Quare $B M$ ad G habebit maiorem rationem, quam ad $B M$ minus tertia parte $E M$, seu quam tripla $B M$, idest $A M$ ad $A M$ minus $E M$; si autem vtriq; parti addatur $E M$, habebit per lemma quartum, $A M$ plus $E M$, idest $A E$ ad $A M$ minorem rationem, quam $A M$ ad $A M$ minus $E M$; ergo $B M$ ad G multo maiorem rationem habebit, quam $A E$ ad $A M$, quod erat primo loco probandum.

Sit secundo $B E$ maior, quam $B M$. Quia per lemma superius, dupla $B M$ plus $B E$ superat triplam G , & $B E$ est æqualis $B M$ plus $E M$, erit tripla $B M$, idest $A M$ plus $E M$ maior tripla G ; quare tripla $B M$ ad triplam G habebit maiorem rationem, quam ad $A M$ plus $E M$; sed ut tripla $B M$ ad triplam G , ita $B M$ ad G ; ergo $B M$ ad G habebit maiorem rationem, quam tripla $B M$, idest $A M$ ad $A M$ plus $E M$; & quia $A M$ ad $A M$, plus $E M$ habet maiorem rationem,

tionem, quam $A'M$ minus EM , idest AE ad AM ,
per lemma tertium; habebit BM ad G multo maiorem
rationem, quam AE ad AM , quod erat probandum.

LEMMA XI.

Si recta linea secetur primo in duo segmenta,
quorum alterum alterius sit quadruplum,
secundo in duo alia quæcunq; segmenta,
habebit minus segmentum primæ sectionis
ad segmentum secundæ sectionis sibi inæ-
quale maiorem rationem, quam sit ratio
quadruplicata alterius segmenti ad maius
segmentum primæ sectionis.

 It recta AB ^A_____ ^E ^M ^E ^B
secta primo ^F_____ ^G
in M ; ita, ut ^R_____ ^R
 AM sit quadrupla ip-_____

fius MB , secundo secta utcumq; in E . Dico BM minus
segmentum primæ sectionis ad EB segmentum secun-
dæ sectionis sibi inæquale habere maiorem rationem,
quam sit ratio quadruplicata AE ad AM .

Cum EB possit esse, vel maior, vel minor, quam BM ;
sit primo minor, & fiant quinq; continuè proportiona-
les AE , & AM , & F , & G , & R ; ita, ut sit, ut AE ad
 AM , ita AM ad F , & F ad G , & G ad R ; erit ratio AE
ad R quadruplicata rationis AE ad AM . Dico BM ad
 BE habere maiorem rationem, quam AE ad R .

Quia AE , plus F superat duplam AM , & AE per

E con-

constructionem est æqualis AM plus ME , erit aggregatum ex AM cum ME cum F maius dupla AM ; vtrunque dematur AM plus ME , erit F maior AM minus ME . Quia vero AE plus G superat AM plus F , si dematur vtrunque AM , erit ME plus G maior, quam F ; ergo multo maior, quam AM minus ME ; ergo si dematur vtrinq; ME , G superabit AM minus duplici ME .

Rursus, quia AM plus R superat F plus G , & F superat AM minus ME , & G superat AM minus duplici ME , multo magis AM plus R superabit duplam AM minus tripla ME ; si vtrinq; dematur AM , & R superabit AM minus tripla ME ; ergo AE ad AM minus tripla ME habebit maiorem rationem, quam ad R ; sed, ut BM ad BE , ita quatuor BM , idest AM ad quatuor BE , idest ad AM minus quatuor ME , & AM ad AM minus quatuor ME habet maiorem rationem, quam AM plus ME , idest AE ad AM , minus tripla ME , per lemma quartum, & AE ad AM minus tripla ME habet maiorem rationem, quam ad R ; ergo BM ad BE habebit multo maiorem rationem, quam AE ad R , quod erat demonstrandum.

A L I T E R.

Quia R superat AM minus tripla ME , & multo magis etiam superabit si dematurea, ad quam ME habeat eam rationem, quam habet BM ad ME ; sed hæc est illa, ad quam quadrupla BM plus ME , idest AE habet eam rationem, quam BM habet ad BM minus ME , idest ad BE ; quare si fiat, ut BM ad BE , ita AE ad aliam, hæc erit minor quam R ; ergo AE ad hanc habebit maiorem rationem, quam ad R ; ergo BM ad BE habebit maiorem

rem

rem rationem, quam $A E$ ad R , quod erat demonstrandum.

Sit secundo $B E$ maior, quam $B M$, & sit iterum, ut $A E$ ad $A M$, ita $A M$ ad F , & F ad G , & G ad R . Dico secundo $B M$ ad $B E$ habere maiorem rationem, quam $A E$ ad R .

Quia $A E$ plus F superat duplam $A M$, & $A E$ est æqualis $A M$ minus $M E$; si utrinque dematur $A E$, erit F maior, quam $A M$ plus $M E$. Quia verò $A E$ plus G superat $A M$ plus F , sit dematur utrinque $A E$, erit G maior F plus $M E$, & G minus $M E$ superabit F ; ergo multo magis $A M$ plus $M E$; Utrique parti addatur $M E$; ergo G superabit $A M$ plus dupla $M E$. Rursus, quia $A M$ plus R superat F plus G , ergo multo magis superabit duplā $A M$ plus tripla $M E$; & si utrinque dematur $A M$, erit R maior $A M$ plus tripla $M E$; ergo $A E$ ad $A M$ plus tripla $M E$ habebit maiorem rationem, quam ad R ; sed ut $B M$ ad $B E$, ita quatuor $B M$, idest $A M$ ad quatuor $B E$, idest $A M$ plus quatuor $M E$; si dematur $M E$, habebit, per lemma tertium, $A M$ ad $A M$ plus quatuor $B E$, idest $B M$ ad $B E$ maiorem rationem, quam $A M$ minus $M E$ ad $A M$ plus tripla $M E$, idest $A E$ ad $A M$ plus tripla $M E$; sed $A E$ ad $A M$ plus tripla $M E$ demonstrata est habere maiorem rationem, quam ad R ; ergo $B M$ ad $B E$ habebit multo maiorem rationem, quam $A E$ ad R , quod erat probandum.

A L I T E R.

Quia R superat $A M$ plus tripla $M E$, multo magis superabit, si ab $A M$ plus tripla $M E$ dematur ea, ad quam $M E$ habeat eam rationem, quam habet $B M$ ad $M E$; sed hæc est illa, ad quam quadrupla $B M$ minus

$E \quad 2 \quad M E,$


ME, idest AE habet eam rationem, quam habet BM ad BM plus ME, idest ad BE; ergo si fiat ut BM ad BE, ita AE ad aliam, hæc erit minor quam R; ergo AE ad hanc habebit maiorem rationem, quam ad R; ergo BM ad BE habet maiorem rationem, quam AE ad R, idest quam sit ratio AE ad AM quadruplicata, quod sumpsimus demonstrandum.

LEMMATA XII.

Si recta linea secetur primo in duo segmenta, quorum alterum alterius sit sesquialterum; tum in alia duo utcumq; habebit minus segmentum primæ sectionis ad segmentum secundæ sectionis sibi inæquale maiorem rationem, quam sit ratio sesquuplicata rationis alterius segmenti secundæ sectionis ad maius segmentum primæ sectionis.



It data recta AB, quæ prius secetur in M; ita ut segmentum AM sit sesquialterum segmenti MB;



deinde utcumq; in E, & fiat, ut AE ad F, ita F ad AM, & AM ad G; erit ratio AE ad G sesquuplicata rationis AE ad AM. Dico BM ad BE habere maiorem rationem, quam AE ad G. Vel BE erit maior quam BM, vel minor. Sit primo BE minor, quam BM, & sit æqualis BM, minus EM; erit AE æqualis AM, plus EM, &

& A M est sesquialtera B M per constructionem.

Quia verò A E, & F, & A M, & G sunt continuè proportionales; erit, per lemma nonum, aggregatum duplæ G, cum A E maius tripla A M; & si dematur vtrinque A E, erit dupla G maior dupla A M, minus M E; & si vtraque pars diuidatur per duo, erit G maior A M minus dimidia M E; Quare A E ad A M minus dimidia M E habebit maiorem rationem, quam ad G; sed quia, vt B M ad B M minus E M; ita sesquialtera B M ad sesquialteram B M minus sesquialtera E M, idest A M ad A M minus sesquialtera E M; si vtrique termino addatur E M, habebit, per Lemma quartum, A M ad A M minus sesquialtera E M maiorem rationem, quam A E ad A M minus dimidia E M; ergo multo maiorem, quam A E ad G; sed vt A M ad A M minus sesquialtera E M, ita est B M ad B M minus E M, idest B M ad B E; ergo B M ad B E habet maiorem rationem, quam A E ad G, idest quam sit ratio sesquuplicata A E ad A M, quod erat primo loco demonstrandum.

Sit secundo B E maior, quam B M, idest æquetur B M, plus E M; erit A E æqualis A M minus E M, & A M est sesquialtera B M, per constructionem.

Quia vero A E, & F, & A M, & G sunt continuè proportionales; erit, per Lemma nonum, aggregatum duplæ G, cum A E maius tripla A M; & si dematur vtrunque A E, erit dupla G maior dupla A M plus M E; & si vtraque pars diuidatur per duo, erit G maior A M, plus dimidia M E. Quare A E ad A M, plus dimidia M E habebit maiorem rationem, quam ad G; sed quia, vt B M ad B E, idest B M plus E M, ita sesquialtera B M ad sesquial-

quialteram B M plus sesquialtera E M, idest A M ad A M plus sesquialtera E M; si ab utroque termino subtrahatur eadem E M, habebit A M ad A M plus sesquialtera E M maiorem rationem, quam A E ad A M, plus dimidia E M; sed A E ad A M plus dimidia E M habet maiorem rationem, quam A E ad G; ergo A M ad A M plus sesquialtera E M habebit multo maiorem rationem, quam A E ad G; sed ut A M ad A M plus sesquialtera E M, ita B M ad B M, plus E M, idest B M ad B E; ergo B M ad B E habebit maiorem rationem, quam A E ad G, idest, quam sit ratio sesquuplicata A E ad A M, quod erat demonstrandum.

L E M M A XIII.

Si recta linea secetur primo in duo segmenta, quorum alterum alterius sit sesquialterum; tum in alia duo utcumque; habebit maius segmentum primæ sectionis ad segmentum secundæ sectionis sibi inæquale maiorem rationem, quam sit ratio subsesquuplicata rationis alterius segmenti secundæ sectionis ad minus segmentum primæ sectionis.



It data re $\overline{A \quad E \quad M \quad E \quad B}$
 & a A B, $\overline{F \quad \quad \quad}$
 quæ prius $\overline{G \quad \quad \quad}$

secetur in M, ita ut B M sit sesquialtera ipsius A M, deinde utcumque in E. Dico B M maius segmentum primæ sectionis ad B E segmentum secundæ sectionis sibi inæquale habere maiorem rationem, quam sit ratio subsesquipli-

quuplicata A E alterius segmenti secundæ sectionis ad A M minus segmentum primæ sectionis.

Inter A E, & A M intelligantur duæ mediæ proportionales F, & G: ita ut sit, ut A E ad F, ita F ad G, & G ad A M (cum autem indeterminata sit A E, & non exigatur ipsa duarum mediarum inter duas datas inuentio, sed solum, ut admittantur inuentæ, hæc hypothesis non officiet geometricæ demonstrationi;) Quare ratio A E ad G erit subsesquuplicata ipsius A E ad A M. Dico B M ad B E habere maiorem rationem, quam A E ad G. Vel B E erit minor, quam B M, vel maior.

Sit primo B E minor, quam B M, & sit æqualis B M minus E M, erit A E æqualis A M plus E M; & quia A M est subsesquialtera B M, erit B M æqualis $\frac{3}{2} A M$, & B E æqualis $\frac{3}{2} A M$ minus E M. Dico $\frac{3}{2} A M$ ad $\frac{3}{2} A M$ minus E M habere maiorem rationem, quam A M plus E M ad G.

Si enim non habeat maiorem rationem, vel habebit æqualem, vel minorem. Habeat primo æqualem; si continuetur ratio A M ad G, ut sint quatuor continuè proportionales, erit quarta continuè proportionalium eadem A M plus E M; si verò habeat minorem rationem; si fiat, ut $\frac{3}{2} A M$ ad $\frac{3}{2} A M$ minus E M, ita A M plus E M ad aliam, hæc erit maior G; nam A M plus E M ad hanc habebit minorem rationem, quam ad G; cum igitur sit maior, quam G, si continuetur ratio A M ad hanc inuentam, ut sint quatuor continuè proportionales, erit quarta continuè proportionalium maior, quam sit A M, plus E M; nam si deficeret ab A M plus E M, euidentius esset etiam inuentam illam deficere a G; quare manifesta esset propositio $\frac{3}{2} A M$ ad $\frac{3}{2} A M$ minus E M habere

re

re maiorem rationem, quam $A M$ plus $E M$ ad G .
 Experiamur igitur, & fiat ut $\frac{1}{2} A M$ ad $\frac{1}{2} A M$ minus $E M$, ita
 $A M$, plus $E M$ ad aliam, exurget $A M$ plus $\frac{E M}{3}$ minus
 $\frac{2 E M \text{ quadratis}}{3 A M}$. Reperiantur nunc quatuor continue propor-
 tionales, quarum prima sit $A M$, & secunda $A M$ plus
 $\frac{E M}{3}$ minus $\frac{2 E M \text{ quadratis}}{3 A M}$; erit tertia $A M$ plus $\frac{2 E M}{3}$ minus
 $\frac{11 E M \text{ quadratis}}{9 A M}$ minus $\frac{4 E M \text{ Cubis}}{9 A M \text{ quadratis}}$ plus $\frac{4 E M \text{ quadrato quadratis}}{9 A M \text{ Cubis}}$; & quarta
 erit $A M$ plus $E M$ minus $\frac{5 E M \text{ quadratis}}{3 A M}$ minus $\frac{27 A M \text{ quadratis}}{27 A M \text{ quadrato Cubis}}$ plus
 $\frac{10 E M \text{ quadrato quadratis}}{9 A M \text{ Cubis}}$ plus $\frac{4 E M \text{ quadrato Cubis}}{9 A M \text{ quadrato quadratis}}$ minus $\frac{8 E M \text{ Cubo Cubis}}{27 A M \text{ quadrato Cubis}}$.
 Hæc ultimo loco inuenta comparanda est cum $A M$ plus
 $E M$, ut cognoscamus, sit ne ipsi æqualis, an cedat, an
 superet; comparetur, & fiat Antithesis; cum utriq; parti
 idem addatur, aut subtrahatur, si extiterint æquales.
 omnia semper erunt æqualia; si verò nō extiterint æqua-
 les, pars, quæ primo superabat, aut cedebat, semper
 etiam superabit, aut cedit; idem etiam accidet, si utraq;
 pars in eandem quantitatem ducatur, aut eidem quanti-
 tati applicetur. Fiat igitur Antithesis, & demantur cō-
 munia, erit prima pars $\frac{10 E M \text{ quadrato quadrata}}{9 A M \text{ Cubis}}$ plus $\frac{4 E M \text{ quadrato Cubis}}{9 A M \text{ quadrato quadratis}}$
 & altera pars erit $\frac{5 E M \text{ quadrata}}{3 A M}$ plus $\frac{4 E M \text{ Cubis}}{27 A M \text{ quadratis}}$ plus $\frac{8 E M \text{ Cubo Cubis}}{27 A M \text{ quadrato Cubis}}$;
 & si utraq; pars ducatur in $27 A M$ quadrato cubos,
 erit prima pars $30 A M$ quadrata in $E M$ quadrato qua-
 dratum plus $12 A M$ in $E M$ quadrato cubum; & secun-
 da pars erit $45 A M$ quadrato quadrata in $E M$ quadra-
 tum, plus $35 A M$ cubis in $E M$ cubum, plus $8 E M$ cubo
 cubis; & si utraq; pars applicetur ad $E M$ quadratum,
 erit prima pars $30 A M$ quadrata in $E M$ quadratum
 plus $12 A M$ in $E M$ cubum; & secunda pars erit $45 A M$
 quadrato quadrata plus $35 A M$ cubis in $E M$ plus
 $8 E M$ quadrato quadratis; ut autem dignoscatur alte-
 rutrius

rutrius partis, quænam sit maior, aut minor, consideretur
 E M, quæ erit, vel minor, vel æqualis, vel maior A M;
 ita tamen, vt si sit maior deficiat à $\frac{3}{2} A M$. Si sit æqualis,
 aut minor, patet 30 A M quadrata in E M quadratum
 plus 12 A M in E M cubum deficere à 45 A M qua-
 drato quadratis plus 35 A M cubis in E M plus 8 E M
 quadrato quadratis; Quare iuxta ea, quæ superius do-
 cuimus, cum inuenta quarta proportionalis deficiat ab
 A M plus E M, habebit $\frac{3}{2} A M$ ad $\frac{3}{2} A M$ minus E M ma-
 iorem rationem, quam A M plus E M ad G, quod
 sumpsimus demonstrandum. Sit verò E M maior A M,
 sed minor quam $\frac{3}{2} A M$; idcirco supponatur E M æqualis
 A M plus F, erit F minor $\frac{A}{2} M$; his positis interpretetur
 vtraq; pars; erit prima pars, idest 30 A M quadrata in
 E M quadratum plus 12 A M in E M cubum æqualis
 42 A M quadrato quadratis plus 96 A M cubis in F
 plus 66 A M quadratis in F quadratum plus 12 A M
 in F cubum; & secunda idest 45 A M quadrato qua-
 drata plus 35 A M cubis in E M plus 8 E M quadrato
 quadratis erit æqualis 88 A M quadrato quadratis plus
 67 A M cubis in F plus 48 A M quadratis in F qua-
 dratum plus 32 A M in F cubum plus 8 F quadrato
 quadratis; & si ab vtraq; parte tollantur communia,
 erit residuum primæ partis 29 A M cubi in F plus 18
 A M quadratis in F quadratum, & residuum secundæ
 partis erit 46 A M quadrato quadrata plus 20 A M in
 F cubum plus 8 F quadrato quadratis; cum autem pa-
 teat primam partem deficere à secunda, quia $\frac{A}{2} M$ supe-
 rat F euidens erit conclusio $\frac{3}{2} A M$ ad $\frac{3}{2} A M$ minus E M ha-
 bere maiorem rationem, quam A M plus E M ad G,
 quod proposuimus.

F

Sit

Sit secundo BE maior, quam BM , & sit æqualis BM plus EM , erit AE æqualis AM minus EM ; & quia AM est subsesquialtera BM , erit BM æqualis $\frac{3}{2}AM$, & BE æqualis $\frac{3}{2}AM$ plus EM ; & iterum intelligatur esse, ut AM minus EM ad F , ita F ad G , & G ad AM ; erit ratio AM , minus EM ad G subsesquuplicata rationis AM minus EM ad AM . Dico igitur $\frac{3}{2}AM$ ad $\frac{3}{2}AM$ plus EM habere maiorem rationem, quam AM minus EM ad G . Si enim non habeat maiorem rationem, vel habebit æqualem, vel minorem; si habeat æqualem, si continuetur ratio AM ad G , ut sint quatuor continuè proportionales, erit quarta continuè proportionalium eadem AM minus EM ; si verò habeat minorem rationem: si fiat, ut $\frac{3}{2}AM$ ad $\frac{3}{2}AM$ plus EM , ita AM minus EM ad aliam, hæc erit maior G ; nam AM minus EM ad hanc habebit minorem rationem, quam ad G ; cum igitur sit maior, quam G , si continuetur ratio AM ad hanc inuentam, ut sint quatuor continuè proportionales, erit quarta continuè proportionalium maior, quam sit AM minus EM ; nam si probetur deficere ab AM minus EM , evidens etiam erit inuentam illam deficere à G ; Quare manifesta erit propositio $\frac{3}{2}AM$ ad $\frac{3}{2}AM$ plus EM habere maiorem rationem, quam AM minus EM ad G . Experiamur igitur, & fiat, ut $\frac{3}{2}AM$ ad $\frac{3}{2}AM$ plus EM , ita AM minus EM ad aliam, hæc erit AM minus $\frac{EM}{3}$ minus $\frac{2}{3}EM$ quadratis. Reperiatur nunc quatuor continuè proportionales, quarum prima sit AM , & secunda sit AM minus $\frac{EM}{3}$ minus $\frac{2}{3}EM$ quadrato; erit tertia AM minus $\frac{2}{3}EM$ minus $\frac{11}{9}EM$ quadratis plus $\frac{4}{9}EM$ Cubis; & quarta erit AM minus EM minus EM

$\frac{5 \text{ E M quadratis}}{3 \text{ A M}}$ plus $\frac{35 \text{ E M Cubis}}{27 \text{ A M quadratis}}$ plus $\frac{30 \text{ E M quadrato quadratis}}{27 \text{ A M Cubis}}$ minus
 $\frac{12 \text{ E M quadrato Cubis}}{27 \text{ A M quadrato quadratis}}$ minus $\frac{8 \text{ E M Cubo Cubis}}{27 \text{ A M quadrato Cubis}}$, quæ, quia cedit ipsi
 $\frac{2 \text{ E M quadratis}}{3 \text{ A M}}$, hoc est illa ad, quam A M minus E M haber
 eam rationem, quam habet $\frac{3 \text{ A M}}{2}$ ad $\frac{3 \text{ A M}}{2}$ plus E M, cedit
 ipsi G; quare $\frac{3 \text{ A M}}{2}$, idest B M ad $\frac{3 \text{ A M}}{2}$ plus E M, idest
 B E habebit maiorem rationem, quam A M minus E M,
 idest A E ad G. Nunc reliquum est, vt probetur
 A M minus E M minus $\frac{5 \text{ E M quadratis}}{3 \text{ A M}}$ plus $\frac{35 \text{ E M Cubis}}{27 \text{ A M quadratis}}$ plus
 $\frac{30 \text{ E M quadrato quadratis}}{27 \text{ A M Cubis}}$ minus $\frac{12 \text{ E M quadrato Cubis}}{27 \text{ A M quadrato quadratis}}$ minus $\frac{8 \text{ E M Cubo Cubis}}{27 \text{ A M quadrato Cubis}}$
 cedere ipsi A M minus E M; fiat ideò Antithesis, & de-
 mantur cōmunia, erit residuum primæ partis $\frac{35 \text{ E M Cubi}}{27 \text{ A M quadratis}}$
 plus $\frac{30 \text{ E M quadrato quadratis}}{27 \text{ A M Cubis}}$; & secundæ partis erit $\frac{5 \text{ E M quadrata}}{3 \text{ A M}}$ plus
 $\frac{12 \text{ E M quadrato Cubis}}{27 \text{ A M quadrato quadratis}}$ plus $\frac{8 \text{ E M Cubo Cubis}}{27 \text{ A M quadrato Cubis}}$. Vtraq; pars ducatur
 in 27 A M quadrato cubos, & applicetur E M quadra-
 to; erit prima pars 35 E M in A M cubum plus 30 E M
 quadratis in A M quadratum; & secunda pars erit 45
 A M quadrato quadrata plus 12 E M cubis in A M plus
 8 E M quadrato quadratis; quia verò E M cedit ipsi A M,
 & prima pars cedit secundæ; quod vt euidentius inno-
 tescat; quia A M superat E M, sit E M æqualis A M mi-
 nus F; si fiat interpretatio, erit prima pars æqualis 65
 A M quadrato quadratis minus 95 A M cubis in F plus
 triginta A M quadratis in F quadratum; & secunda pars
 erit 65 A M quadrato quadrata minus 68 A M cubis in
 F plus 84 A M quadratis in F quadratum minus 44 A M
 in F cubum plus 8 F quadrato quadratis; si fiat Antithe-
 sis, & demantur communia, erit prima pars æqualis 44
 A M in F cubum, & secunda pars erit æqualis 27 A M
 cubis in F plus 54 A M quadratis in F quadratum plus

F 2

8 F

8 F quadrato quadratis . Quia autem F cedit ipsi A M, erit factum ex A M in F cubum minus facto ex A M in F quadratum ; quare 44 A M in F cubum cedent 44 A M quadratis in F quadratū . Et idcirco multo magis prima pars cedit secundæ parti. Quare evidens erit propositio .

L E M M A XIV.

Si recta linea secetur primo in duo segmenta, quorum alterum alterius sit quadruplum, secundo in duo alia quæcunq; segmenta, habebit maius segmentum primæ sectionis ad segmentum secundæ sectionis sibi inæquale maiorem rationem , quam sit ratio subquadruplicata alterius segmenti ad minus segmentum primæ sectionis .



It data recta A B, quæ prius secetur in M; ita
 ut B M sit $\frac{A}{E} \frac{M}{E}$
 quadrupla $\frac{F}{G}$
 ipsius A M; secundo $\frac{H}{A}$
 secetur utcumq; in E . Dico B M maius segmentum primæ sectionis ad B E segmentum secundæ sectionis sibi inæquale habere maiorem rationem, quam sit ratio subquadruplicata alterius segmenti A E ad minus segmentum primæ sectionis A M . Inter A E, & A M sint tres continuè proportionales F, & G, & H; ita, ut sint quinque continuè proportionales, quarum prima sit A E, secunda F, tertia G, quarta H, quinta A M, habebit A E ad F rationem subquadruplicatam eius, quam habet
 ad

ad A M . Quare dico B M ad B E habere maiorem rationem, quam A E ad F . Vel B E erit maior, quam B M , vel minor .

Sit primò B E minor, quam B M; & quia B M est equalis quadruplæ A M, sit B E æqualis quadruplæ A M minus M E, & A E sit æqualis A M, plus M E . Dico 4 A M ad 4 A M minus M E habere maiorem rationem, quam sit ratio A M plus M E, siue A E ad F, seu quam sit ratio subquadruplicata A M plus M E ad A M; si enim non habeat maiorem, vel habebit eandem, vel minorem; si habeat eandem; si fiat, vt 4 A M ad 4 A M minus M E, ita A M plus M E ad aliam, hæc erit æqualis F; & si hæc ratio continuetur, vt sint quinq; continuè proportionales, erit quinta ipsa A M; si verò habeat minorem rationem, si fiat, vt 4 A M ad 4 A M minus M E, ita A M plus M E ad aliam, hæc erit maior, quam F; & idèd, si hæc ratio continuetur, vt sint quinq; continuè proportionales, erit quinta maior A M; si verò habeat maiorem, tunc si fiat, vt 4 A M ad 4 A M minus M E, ita A M plus M E ad aliam, hæc erit minor, quam F; idcirco, si hæc ratio continuetur, vt sint quinque continuè proportionales, erit quinta minor A M . Reperiantur igitur in ratione 4 A M ad 4 A M minus M E quinq; continuè proportionales, quarum prima sit A M plus M E; si quinta probabitur minor, quam sit A M, probata erit propositio . Cum in ratione, quam habent 4 A M ad 4 A M, minus M E quinq; continuè proportionalium, prima sit A M plus M E, erit secunda A M plus $\frac{3}{4} \frac{M E}{A M}$ minus $\frac{M E \text{ quadrato}}{4 A M}$; & tertia erit A M plus $\frac{M E}{2}$ minus $\frac{7}{16} \frac{M E \text{ quadratis}}{A M}$ plus $\frac{M E \text{ Cubo}}{16 A M \text{ quadratis}}$; & quarta erit A M, plus $\frac{M E}{4}$

$\frac{M E}{4}$ minus $\frac{9 M E \text{ quadratis}}{16 A M}$ plus $\frac{11 M E \text{ Cubis}}{64 A M \text{ quadratis}}$ minus $\frac{M E \text{ quadrato quadrato}}{64 A M \text{ Cubis}}$;
 & quinta erit $A M$ minus $\frac{5 M E \text{ quadratis}}{8 A M}$ plus $\frac{5 M E \text{ Cubis}}{16 A M \text{ quadratis}}$ minus
 $\frac{15 M E \text{ quadrato quadratis}}{256 A M \text{ Cubis}}$ plus $\frac{M E \text{ quadrato Cubo}}{256 A M \text{ quadrato quadratis}}$, quæ si comparatur
 cum $A M$, erit minor ipsa $A M$; comparatur enim, &
 fiat Antithesis, & dematur communis $A M$, erit prima
 pars $\frac{5 M E \text{ Cubi}}{15 A M \text{ quadratis}}$ plus $\frac{M E \text{ quadrato Cubo}}{256 A M \text{ quadrato quadratis}}$; & secunda pars erit
 $\frac{5 M E \text{ quadrata}}{8 A M}$ plus $\frac{15 M E \text{ quadrato quadratis}}{256 A M \text{ Cubis}}$; utraq; pars ducatur in
 $256 A M \text{ quadrato quadrata}$, & applicetur $M E$ qua-
 drato, erit prima pars $80 M E$ in $A M$ quadratum plus
 $M E$ cubo ; & secunda pars erit $160 A M$ cubi plus
 $15 A M$ in $M E$ quadratum ; ut autem prima pars sit
 omnium maxima ponatur $M E$ omnium maxima ; nam
 si ponatur minor, prima pars semper magis decrescet à
 secunda parte, ut patet ; quia autem, cum, ut sit maxi-
 ma, possit excedere triplam $A M$, sed deficere debeat
 à quadrupla, ponatur $M E$ æqualis triplæ $A M$ plus F ;
 ita tamen, ut $A M$ superet F ; erit, facta interpretatione
 prima pars æqualis $267 A M$ cubis plus $107 A M$ qua-
 dratis in F plus $9 A M$ in F quadratum plus F cubo ;
 & secunda pars erit æqualis $295 A M$ cubis plus $90 A M$
 quadratis in F plus $15 A M$ in F quadratum ; & si
 utrinq; demantur communia, erit prima pars $17 A M$
 quadrata in F plus F cubo, & secunda erit $28 A M$
 cubi plus $6 A M$ in F quadratum . Quia vero $A M$
 superat F patet etiam primam partem deficere à se-
 cunda . Quare patet propositio ; hoc est $B M$ ad $B E$
 habere maiorem rationem, quam sit ratio $A E$ ad $A M$
 subquadruplicata posita $B M$ maiori, quam $B E$.
 Sit secundo $B E$ maior, quam $B M$; idè sit æqualis
 quadruplæ $A M$ plus $M E$, & $A E$ sit æqualis $A M$
 minus

minus M E , & positis inter A M minus M E , idest
 A E , & A M tribus continuè proportionalibus F , &
 G , & H , vt superius ; erit ratio A M minus M E ad
 F subquadruplicata rationis A M minus M E ad A M .
 Dico igitur 4 A M ad 4 A M plus M E habere ma-
 iorem rationem , quam A M minus M E ad F ; nam si
 fiat , vt 4 A M ad 4 A M plus M E , ita A M minus
 M E ad aliam , hæc erit minor , quam F ; & si continue-
 tur ratio , vt sint quinque continuè proportionales , pri-
 ma existente A M minus M E , quinta erit minor ipsa
 A M ; quare euidenter erit propositio . Continuentur in
 ratione , quam habent 4 A M ad 4 A M plus M E
 quinq; continuè proportionales , quarum prima sit A M ,
 minus M E ; erit secunda A M minus $\frac{3}{4} M E$ minus
 $\frac{M E \text{ quadrato}}{4 A M}$; & tertia erit A M minus $\frac{M E}{2}$ minus $\frac{7 M E \text{ quadratis}}{16 A M}$
 minus $\frac{M E \text{ Cubo}}{16 A M \text{ quadratis}}$; & quarta erit A M minus $\frac{M E}{4}$ mi-
 nus $\frac{9 M E \text{ quadratis}}{16 A M}$ minus $\frac{11 M E \text{ Cubis}}{64 A M \text{ quadratis}}$ minus $\frac{M E \text{ quadrato quadrato}}{64 A M \text{ Cubis}}$; &
 quinta , & vltima erit A M minus $\frac{5 M E \text{ quadratis}}{16 A M \text{ quadratis}}$ minus $\frac{8 A M}{M E \text{ quadrato Cubo}}$
 $\frac{15 M E \text{ quadrato quadratis}}{256 A M \text{ Cubis}}$ minus $\frac{M E \text{ quadrato quadrato}}{256 A M \text{ quadrato quadratis}}$,
 quæ cum deficiat ab A M , idcirco euidenter erit con-
 clusio , etiam in hoc casu , quando B E superat B M
 habere B M ad B E maiorem rationem , quam sit ra-
 tio A E ad A M subquadruplicata , quod erat demon-
 strandum .




PRO-

PROPOSITIONES.

PROPOSITIO I. ZETETICA.

Inuenire maximum rectangulum contentum sub duobus segmentis propositæ rectæ lineæ.



It recta linea A B,  quæ secanda sit; ita, vt, quod sub segmentis sit rectangulum sit omnium maximum.

Cum methodo huius Analysis mihi in reliquis sit vtendum liceat in hac prima longius digredi, vt methodi vis appareat.

Per Analysism Zeticam ponatur A B æqualis B, & alteri segmento sit æqualis A: erit reliquum segmentum B minus A, ex quibus segmentis factum rectangulum erit B in A minus quadrato ex A; vt autem hoc rectangulum sit omnium maximum inueniendum est, quam rationem A debeat habere ad B.

Hoc, vt fiat, sumenda erit altera maior, aut minor ipsa A, sed minor, quam B; si autem sit maior ipsa A, quæ sumitur, erit reliduum ad B hac detracta minus residuo ad B detracta ipsa A; Quare vnus augmentum erit alterius decrementum. Sit igitur alterum segmentum A plus E, erit alterum B minus A minus E; & factum sub segmentis erit B in A minus A quadrato minus duplici A in E plus B in E minus E quadrato; Quare differentia inter hoc rectangulum, & superius erit B in E minus duplici A in E minus E quadrato; idest, quod

G

fit

fit ex B minus duplici A minus E in E ; aut igitur duplex A plus E deficiet à B, aut excedet ; si deficiet à B, hoc secundum rectangulum altero maius erit ; quare in primo A erit minus, quam dimidium ipsius B, & rectangulum non erit maximum ; & si A superet dimidium ipsius B, & B minus A deficiet ab ipso dimidio, ergo etiam rectangulum non erit maximum ; Quare cum A non possit neque excedere, neque deficere à dimidio ipsius B, vt sit rectangulum maximum, necesse est A æquari ipsius B dimidio ; sed cum instituenda sit Analysis iuxta methodum Analysis maximi, & minimi ; cum E vni segmento addatur, & alteri subtrahatur, supponatur æquale nihilo ; quodcumq; factum erit in E erit æquale nihilo, & cum differentia à maximo æquetur nihilo, si ea, quæ ducuntur in E, & constituunt differentiã inter se comparentur cognoscetur relatio ipsius A ad B.

Differentia igitur rectangulorum est B in E, minus duplici A in E minus E quadrato æqualis nihilo ; ergo per Antithesim erit B in E æqualis duplici A in E plus E quadrato : Si omnia applicentur ipsi E, erit B æqualis duplici A plus E ; sed E est æqualis nihilo, ergo B erit æqualis duplici A ; ergo tunc fit maximum rectangulum, quando æqualia sunt segmenta . Hinc

P O R I S M A.

Maximum rectangulum, quod fit sub segmentis data rectæ lineæ est id, quod fit quando segmenta sunt inter se æqualia.

Hoc demonstratur ab Euclide lib. 6. Theoremate vigesimo propositione 27. in qua demonstratur.

Omnium Parallelogrammorum secundum eandem lineam

lineam applicatorum deficientiumq; figuris parallelo-
grammis similibus, similiterq; positus ei, quod à dimidia
describitur, maximum est quod ad dimidium applicatur
simile existens defectui.

Nam si Parallelogrāmum deficiens debeat assimilari
quadrato erit sub segmentis lineæ factū rectangulū. Qui-
bus, vt ab Euclide demonstratis nō immorabor, sed hoc
p lineas homologas demonstrabo sequēti propositione.

Eadem propositio per lineas homologas data
rationali proposita, & demonstrata.

Posita rationali, & linea, quæ secetur vtcunq;
si fiat, vt rationalis ad alterum segmentum,
ita alterum segmentum ad aliam, hæc erit
omnium maxima, quando segmenta erunt
æqualia.

Sit data C rationalis, & recta A B, quæ secetur
bifariam in $\overset{A}{\text{---}} \overset{D}{\text{---}} \overset{E}{\text{---}} \overset{B}{\text{---}}$
D, & non $\overset{C}{\text{---}} \overset{G}{\text{---}}$
bifariam in E; & fiat, $\overset{F}{\text{---}}$
vt C ad A D, ita D B ad F; & vt C ad A E, ita E B ad G.
Dico F superare G. Quia, per lemma quintum, D B ad
E B habet maiorem rationem, quam A E ad D B, & E B
ad G per constructionem eandem, quam C ad A E, ha-
bebit ex perturbata Analogia D B ad G maiorem ratio-
nem, quam C ad D B; sed vt C ad D B, ita D B ad F;
nam D B æqualis est A D, ergo ex eadem perturbata
Analogia maiorem rationem habet C ad G, quam ad F,
ergo F superat G, quod erat demonstrandum.

G 2

PRO-

PROPOSITIO II. ZETETICA.

Inuenire maximum solidum, quod fieri possit
sub segmento propositæ rectæ lineæ,
& quadrato alterius segmenti.



It recta data B oportet ipsam ita secare,
vt, quod sit sub altero segmento in alte-
rius segmenti quadratum sit omnium
maximum eorum, quæ sub quacunq; alia
diuersa sectione fieri possint.

Sit alterum segmentum A, erit alterum B minus A;
& quod sit ex B minus A in A quadratum, erit B in A
quadratum minus A cubo; determinanda autem sit ipsa
A, vt hoc productum sit omnium maximum.

Iuxta superiorem methodum ponatur E æquale ni-
hilo, & sit alterum segmentum A plus E, erit alterum
B minus A minus E, & quadratum ex A plus E erit A
quadratum plus duplici rectangulo ex A in E plus E
quadrato, quod ductum in B minus A minus E produ-
cet solidum B in A quadratum minus A cubo plus du-
plici solido ex B in A in E plus B in E quadratum mi-
nus triplici solido ex A quadrato in E minus triplici
solido ex A in E quadratum minus E cubo; & horum
genitorum solidorum differentia erit duplex solidum ex
B in A in E plus solido ex B in E quadratum minus
triplo solido ex A quadrato in E minus triplo solido ex
A in E quadratum minus E cubo æqualis nihilo. Quare
omnibus applicatis ad E, & facta Antithesi, erit duplex
B in A minus triplici quadrato ex A æquale triplici re-
ctan-

Angulo ex A in E plus E quadrato plus B in E, idest
nihil, cum E æquetur nihilo; ergo facta Antithesi, erit
duplex B in A æquale triplici A quadrato, & si omnia
applicentur ad A, erit duplex B æqualis triplici A,
& si omnia diuidantur per tria, erunt duæ tertiæ partes
ipsius B æquales ipsi A. Hinc

P O R I S M A.

*Maximum solidum, quod applicatur alicui lineæ deficiens
cubo est id, quod tertiæ parti datæ lineæ applicatur, & cubus
adiacet duabus tertijs partibus datæ rectæ.*

Quod demonstratur ab Eutocio ad Archimedes de
Sphæra, & Cylindro libro secundo propositione tertia,
sed ope conicarum sectionum, & ab insigni nostri seculi
Mathematico Bonauentura Caualerio per methodum
indiuisibilem. Nos verò Geometricè demonstrabimus
sequenti propositione.


T H E O R E M A.

Omnium solidorum ad eandem lineam applica-
torum, & deficientium figuris solidis, simili-
bus, similiterq; positis maximum est illud,
quod ad datæ lineæ tertiam partem applicatur.

S It data linea AB, cuius tertia pars sit AC, cui
applicetur solidum ex AC in CD in CI defi-
ciens solido ex CD in CI in CB. Dico esse
maximum omnium solidorum, quæ applicari possint ad
aliud, atq; aliud eiusdem lineæ segmentum deficientium
solido simili, similiterq; posito solido CD in CI in CB.

Su-

Sumatur ipsa AC tertia parte datæ rectæ maior, aut minor quæcunque. Sit primo maior AE , cui applicetur solidum ex AE in EF in EL deficiens solidum ex EF in EL in EB simili, similiterq; posito solidum ex CD in CI in CB ; nam BE ad EF est, vti CB ad CD , & BE ad EL est, vti CB ad CI . Dico solidum ex AC in CD in CI superare solidum ex AE in EF in EL .



Analysis primæ partis.

PER Analysim supponatur solidum ex AC in DC in CI superare solidum ex AE in EF in EL , habebit DC ad EF maiorem rationem, quam factum ex AE in EL ad factum ex AC in CI ; sed DC ad EF est, vti BC ad BE ; ergo BC ad BE habebit maiorem rationem, quam factum ex AE in EL ad factum ex AC in CI , & factum sub extremis superabit factum sub medijs; ergo solidum ex BC in AC in CI superabit solidum ex BE in AE in EL ; ergo factum ex BC in AC ad factum ex BE in AE habebit maiorem rationem, quam EL ad CI ; sed, vt EL ad CI , ita BE ad BC : ergo factum ex BC in AC ad factum ex BE in AE habebit maiorem rationem, quam BE ad BC , & factum sub extremis superabit factum sub medijs; ergo factum ex BC quadrato in AC superabit factum ex BE quadrato in AE ; quia autem BC est æqualis duplici AC , & BE est æqualis duplici AC minus CE , & AE est æqualis AC plus CE , si fiat in-

interpretatio, erit factum ex BC quadrato in AC æquale quadruplo cubo ex AC , & factum ex BE quadrato in AE erit æquale quadruplo cubo ex AC minus triplo solido ex AC in CE quadratum plus CE cubo; Quamobrem quadruplus cubus ex AC superabit quadruplum cubum ex AC minus triplo solido ex AC in CE quadratum plus cubo ex CE ; & si fiat Antithesis, quadruplus cubus ex AC , plus triplo solido ex AC in CE quadratum superabit quadruplum cubum ex AC plus cubo ex CE ; & si demantur communia, erit triplum solidum ex AC in CE quadratum maius cubo ex CE ; & si omnia applicentur ad CE quadratum, erit tripla AC maior CE , quod patet. Quare certa conclusio nunc ad Synthesim.

Synthesis primæ partis,

Q Via AB est æqualis triplæ AC , & AB superat CE , erit tripla AC maior, quam CE , & factum ex tripla AC in CE quadratum superabit CE cubum, & si vtrique quantitati addatur quadruplus cubus ex AC , erit aggregatum ex quadruplo cubo ex AC plus triplo solido ex AC in CE quadratum maius aggregato ex quadruplo cubo ex AC plus cubo ex CE , & facta Antithesi, quadruplus cubus ex AC superabit quadruplum cubum ex AC minus triplo solido ex AC in CE quadratum plus cubo ex CE ; Quia verò BC est æqualis duplici AC , erit quadruplus cubus ex AC æqualis facto ex BC quadrato in AC ; item quia BE est æqualis duplici AC minus CE , & AE est æqualis AC plus CE ; si fiat interpretatio
erit


erit quadruplus cubus ex $A C$ minus triplo solido ex $A C$ in $C E$ quadratum plus cubo ex $C E$ æquale facto ex $B E$ quadrato in $A E$; Quamobrem factum ex $B C$ quadrato in $A C$ superabit factum ex $B E$ quadrato in $A E$, & factum ex $B C$ in $A C$ ad factum ex $B E$ in $A E$ habebit maiorem rationem, quam $B E$ ad $B C$; sed ut $B E$ ad $B C$, ita $E L$ ad $C I$, ergo factum ex $B C$ in $A C$ ad factum ex $B E$ in $A E$ habebit maiorem rationem, quam $E L$ ad $C I$; ergo solidum ex $B C$ in $A C$ in $C I$ superabit solidum ex $B E$ in $A E$ in $E L$; ergo $B C$ ad $B E$ habebit maiorem rationem, quam factum ex $A E$ in $E L$ ad factum ex $A C$ in $C I$; sed, ut $B C$ ad $B E$, ita est $D C$ ad $E F$: ergo $D C$ ad $E F$ habebit maiorem rationem, quam factum ex $A E$ in $E L$ ad factum ex $A C$ in $C I$; ergo solidum ex $D C$ in $A C$ in $C I$ superabit solidum ex $A E$ in $E L$ in $E F$, idest solidum applicatum tertiæ parti datæ rectæ superabit solidum applicatum parti maiori, quam sit tertia pars datæ rectæ, quod erat primo loco demonstrandum.

Analysis secundæ partis.

SIT secundo $A E$ minor, quam $A C$, cui applicetur solidum ex $A E$ in $E F$ in $E L$ deficiens solido ex $E F$ in $E L$ in $E B$ simili, similiterq; posito solido ex $C D$ in $C I$ in $C B$. Dico solidum ex $A C$ in $C D$ in $C I$ superare solidum ex $A E$ in $E F$ in $E L$. Per Analysis supponatur solidum ex $A C$ in $C D$ in $C I$ superare solidum ex $A E$ in $E F$ in $E L$, habebit $C D$ ad $E F$ maiorem rationem, quam factum ex $A E$ in $E L$ ad factum ex $A C$ in $C I$; sed $D C$ ad $E F$ est, uti $B C$

ad

ad BE; ergo BC ad BE habebit maiorem rationem,
quam factum ex AE in EL ad factum ex AC in CI,
& factum sub extremis superabit factum sub medijs; er-
go solidum ex BC in AC in CI superabit solidum ex
BE in AE in EL; ergo factum ex BC in AC ad
factum ex BE in AE habebit maiorem rationem, quam
EL ad CI; sed ut EL ad CI, ita BE ad BC; ergo
factum ex BC in AC ad factum ex BE in AE habebit
maiorem rationem, quam BE ad BC,



& factum sub extremis superabit fa-
ctum sub medijs; ergo factum ex BC
quadrato in AC superabit factum
ex BE quadrato in AE, quod pa-
tet; Quia cum BC sit æqualis duplici AC, & BE sit
æqualis duplici AC plus CE, & AE sit æqualis AC
minus CE; si fiat interpretatio, erit factum ex BC qua-
drato in AC æquale quadruplo cubo ex AC; & fa-
ctum ex BE quadrato in AE erit æquale quadruplo
cubo ex AC minus triplici solido ex AC in CE qua-
dratum, minus cubo ex CE; Quare certa conclusio.
Hinc ad Synthesim.


Synthesis secundæ partis.

Quia quadruplus cubus ex AC superat quadru-
plum cubum ex AC minus triplici solido ex AC
in CE quadratum minus cubo ex CE; & quadruplo
cubo ex AC æquale est factum ex BC quadrato in AC,
quia BC est æqualis duplici AC; item quadruplo
cubo ex AC minus triplici solido ex AC in CE qua-
dratum minus cubo ex CE est æquale factum ex BE

H

qua-

quadrato in AE , quia BE est æqualis duplici AC plus CE , & AE est æqualis AC minus CE ; etiam factum ex BC quadrato superabit factum ex BE quadrato in AE ; Quare factum ex BC in AC ad factum ex BE in AE habebit maiorem rationem, quam BE ad BC ; sed, ut BE ad BC , ita EL ad CI ; ergo factum ex BC in AC ad factum ex BE in AE habebit maiorem rationem, quam EL ad CI , & solidum ex BC in AC in CI superabit solidum ex BE in AE in EL , & factum ex AC in CI ad factum




ex AE in EL habebit maiorem rationem, quam BE ad BC ; sed ut BE ad BC , ita EF ad DC ; ergo factum ex AC in CI ad factum ex AE in EL habebit maiorem rationem, quam EF ad DC , & factum sub extremis superabit factum sub medijs; factum igitur ex AC in CI in CD superabit factum ex AE in EL in EF , idest solidum applicatum tertiæ parti datæ lineæ superabit solidum applicatum parti minori, quam sit tertia pars datæ lineæ simili existente defectu, quod erat probandum; Cum autem demonstratum sit superare etiam id, quod applicatur parti maiori, idem certa conclusio.

Eadem propositio secunda demonstrata, & proposita per lineas homologas, data rationali.

Datis duabus rectis lineis, quarum altera se habens loco rationalis sit non secta; altera verò

verò secta vteunq; , & alterum segmentum sectæ habeat ad aliam lineam rationem duplicatam eius , quam habet rationalis ad alterum segmentum . Dico hanc lineam fore omnium maximam , quando segmentum ad quod refertur rationalis erit æquale duabus tertijs partibus datæ rectæ .



S It recta quæcunq; C, quæ ponatur, vti rationalis, & altera O M, quæ secetur in B, & E; & fiat, vt C ad O B, ita O B ad G, &, vt C ad G, ita B M ad H.

Item, vt C ad O E, ita O E ad I, &, vt C ad I, ita E M ad K; O B verò sit æqualis duabus tertijs partibus ipsius O M; O E verò vel duas tertias partes superet, vel ipsis cedat . Dico H superare K.

Fiat vt G ad H, ita I ad N; Quia C, & O B, & G; item C & O E, & I sunt duæ series continuè proportionalium ab eadem C incipientiũ, per lemma secundũ habebit I ad G duplicatam rationem eius, quam habet O E ad O B; item, quia, vt C ad G, ita B M ad H, erit, vt C ad B M, ita G ad H; item quia, vt C ad I, ita E M ad K, erit, vt C ad E M, ita I ad K. Tum considerentur tres rectæ I, G, H, & I, N, K; Quia, vt C

H 2 ad

ad E M, ita I ad K, & ut G ad H, idest C ad B M, ita I ad N, erit N ad K, ut B M ad E M; sed per lemma sextum B M ad E M habet maiorem rationem, quam I ad G; ergo N ad K habebit maiorem rationem, quam sit ratio duplicata O E ad O B, idest quam I ad G; ut autem G ad H, ita I ad N; ergo per perturbatam Analogiam I ad K habet maiorem rationem, quam ad H, ergo H superat K.

PROPOSITIO III. ZETETICA.

Inuenire maximum solidum, quod possit applicari dato plano, deficiens solido simili dato, & datum, cui debeat assimilari defectus sit cubus.



It datum B planum, & oporteat illud ita secare, ut si alteri segmento applicetur solidum deficiens cubo sit maximum omnium, quæ possint applicari deficientium figura simili, similiterque posita.

Cum defectus debeat esse cubus, oportet planum datum applicare lateri cubi defectiui. Sit illud latus A, erit alterum latus, quod exurget ex applicatione B plani ad A; idest $\frac{B \text{ planum}}{A}$, quod in duo segmenta secabitur, quorum alterum erit A, alterum erit $\frac{B \text{ planum}}{A}$ minus A, quæ pars ducta in ipso A quadratum exurget planum applicatum, idest B planum in A minus A cubo; reliquum est, ut determinetur quantitas ipsius A, ut B planum in A minus A cubo sit maximum.

Per superiorem Methodum sit E æquale nihilo, & fu-

sumatur A plus E pro vno latere, ad quod applicetur B planum, erit latus alterum ex applicatione exurgens $\frac{B \text{ planum}}{A \text{ plus E}}$, cuius alterum segmentum erit A plus E, alterum $\frac{B \text{ planum}}{A \text{ plus E}}$ minus A minus E. Hoc vltimum segmentum ductum in quadratum ex latere A plus E; idest in quadratum ex A plus duplici rectangulo ex A in E plus quadrato ex E, erit planum applicatum, idest B planum in A plus B plano in E minus A cubo minus triplici solido ex A quadrato in E minus triplici solido ex A in E quadratum minus E cubo; & horum solidorum differentia erit B planum in E minus triplici solido ex A quadrato in E minus triplici solido ex A in E quadratum minus E cubo, quæ differentia æquabitur nihilo; Quare facta Antithesi, erit B planum in E æquale triplici solido ex A quadrato in E plus triplici solido ex A in E quadratum plus E cubo; & si vtraq; pars applicetur ad E, erit B planum æquale triplici quadrato ex A plus triplici rectangulo ex A in E plus quadrato ex E; & quia E supponitur æquari nihilo, erit etiam factum in E æquale nihilo. Quare B planum æquabitur triplici quadrato ex A: Tertia igitur pars ipsius B plani erit quadratum ex A. Quocirca maximum solidum erit, quod ad duas ex tribus partibus B plani applicabitur: sumenda igitur erit ipsius B plani pars tertia, & inquirendum latus, quod ipsam potest, ad quod applicato B plano exurget longitudo tripla lateris, cui facta est applicatio, cuius duæ partes in reliquæ quadratum ductæ constituent maximum solidum applicatum deficiens cubo. Hinc

P O.


& solidum ex EP in EK in EG erit applicatum minori parti dati plani, quam sint ipsius duæ tertiæ partes (cum BE in EK superet BC in CI tertiam partem dati plani) deficiens solido simili, similiterq; posito ei, quo deficit planum applicatū duabus tertijs partibus dati plani. Quare

Dico primo solidum ex CI in CD in CO superare solidum ex EK in EP in EG .

Analysis primæ partis.

Superet solidum ex CI in CD in CO solidum ex EK in EP in EG ; & solidum ex CI in CB in CO sit simile solido ex BE in EK in EP ; quia solidum ex CI in CD in CO superat solidum ex EK in EP in EG , habebit CD in CI ad GE in EK maiorem rationem, quam EP ad CO ; sed uti EP ad CO , ita est BE ad BC ; ergo factum ex CD in CI ad factum ex GE in EK habebit maiorem rationem, quam BE ad BC ; sed GE in EK æquatur facto ex CI in BD minus facto ex BE in EK ; ergo factum ex CD in CI ad factum ex CI in BD minus facto ex BE in EK habet maiorem rationem, quam BE ad BC ; & factum sub extremis superabit factum sub medijs; ergo solidum ex BC in CD in CI superabit solidum ex BE in CI in BD minus solido ex BE quadrato in EK ; & per Antithesim solidum ex BC in CD in CI , una cum solido ex BE quadrato in EK superabit solidum ex BE in CI in BD : Quia verò CD est æqualis duplici BC , erit solidum ex BC in CD in CI æquale solido ex duplici BC quadrato in CI ; item, quia

quia BE est æqualis BC plus CE , & BD est æqualis triplici BC , erit factum ex BE in BD æquale triplici BC quadrato plus triplici rectangulo ex CE in BC : idcirco factum ex BE in CI in BD erit æquale facto ex triplici BC quadrato in CI plus triplici solido ex BC in CE in CI ; Quare interpretando factum ex duplici quadrato ex BC in CI , una cum facto ex BE quadrato in EK superabit solidum ex triplo quadrato BC in CI , una cum solido ex tripla BC in CE in CI ; & demptis communibus, idest facto ex duplici quadrato ex BC in CI , erit factum ex BE quadrato in EK



maius solido ex BC quadrato in CI , una cum solido ex tripla BC in CE in CI ; Quare BE quadratum ad quadratum ex BC

plus triplo facto ex BC in CE habebit maiorem rationem, quam CI ad EK , seu per constructionem, quam BC ad BE ; ergo factum sub extremis superabit factum sub medijs; Quare cubus ex BE superabit cubum ex BC plus triplici solido ex BC quadrato in CE , quod patet; quia interpretando BE in BC plus CE erit cubus ex BE æqualis cubo ex BC plus triplici solido ex BC quadrato in CE plus triplici solido ex CE quadrato in BC plus cubo ex CE . Quare ad Synthesim.

Syn-

Synthesis primæ partis.

Quia BE est æqualis BC plus CE , erit cubus ex BE æqualis cubo ex BC plus triplici solido ex BC quadrato in CE plus triplici solido ex CE quadrato in BC plus cubo ex CE ; quare superabit cubum ex BC plus triplici solido ex BC quadrato in CE ; & idè BE quadratum ad BC quadratum plus triplici facto ex BC in CE habebit maiorem rationem, quam BC ad BE , idest CI ad EK , & factum sub extremis superabit factum sub medijs; solidum igitur ex quadrato BE in EK superabit solidum ex BC quadrato in CI , vna cum solido ex triplici BC in CE in CI ; vtrique parti addatur factum ex duplici quadrato BC in CI ; factum ex duplici quadrato ex BC in CI vna cum facto ex BE quadrato in EK superabit solidum ex triplici quadrato BC in CI vna cum solido ex tripla BC in CE in CI . Quia verò CD est æqualis duplici BC , erit factum ex duplici quadrato ex BC in CI æquale solido ex BC in CD in CI ; & quia BE est æqualis BC plus CE , & BD est æqualis triplici BC , erit factum ex BE in BD æquale triplici BC quadrato plus triplici rectangulo ex CE in BC ; idcirco factum ex triplici BC quadrato in CI plus triplici solido ex BC in CE in CI , erit æquale facto ex BE in CI in BD . Quamobrem interpretando solidum ex BC in CD in CI vna cum solido ex BE quadrato in EK superabit solidum ex BE in CI in BD ; & per Antithesim solidum ex BC in CD in CI superabit soli-

I dum


reliquas duas tertias partes; fiat ex $C I$ in $C D$ in $C O$ solidum deficiens solido ex $C I$ in $C B$ in $C O$. Tum facto plano $F B$ in $B G$ æquali plano dato ex $A B$ in $B D$, sumatur $B E$ minor, quam $B C$, completaque figura $B E$ in $E K$, quæ sit similis figuræ $B C$ in $C I$; & ut $B C$ ad $B E$, ita fiat $C O$ ad $E P$; ita, ut solidum ex $E K$ in $E B$ in $E P$ sit simile, similiterq; positum, solido ex $C I$ in $C B$ in $C O$, & solidum ex $E P$ in $E K$ in $E G$ erit applicatum parti maiori dati plani, quam sint ipsius duæ tertiæ partes, cum $B E$ in $E K$ deficiat à $B C$ in $C I$ tertia parte dati plani, & deficiet solido simili, similiterq; posito ei, quo deficit planum applicatum duabus tertijs partibus dati plani. Quare

Dico secundo solidum ex $C I$ in $C D$ in $C O$ superare solidum ex $E K$ in $E P$ in $E G$. Sit igitur solidum ex $C I$ in $C D$ in $C O$ maius solido ex $E K$ in $E P$ in $E G$, habebit factum ex $C I$ in $C D$ ad factum ex $E K$ in $E G$ maiorem rationem, quam sit ratio $E P$ ad $C O$; sed $E P$ ad $C O$ est uti $B E$ ad $B C$; & quia per constructionem factum ex $C I$ in $B D$ æquatur facto ex $E K$ in $B G$, erit factum ex $E K$ in $E G$ æquale facto ex $C I$ in $B D$, minus facto ex $B E$ in $E K$; ergo factum ex $C I$ in $C D$ ad factum ex $C I$ in $B D$ minus facto ex $B E$ in $E K$ habet maiorem rationem, quam $B E$ ad $B C$, & factum sub extremis superabit factum sub medijs. Quare solidum ex $C I$ in $B C$ in $C D$ superabit solidum ex $C I$ in $B D$ in $B E$ minus solido ex $B E$ quadrato in $E K$; & per Antithesim solidum ex $B E$ quadrato in $E K$ maius erit solido ex $C I$ in $B D$ in $B E$ minus solido ex $C I$ in $B C$ in $C D$; & quia

I 2

B D

BD æquatur triplici BC, & CD duplici BC, & BC æquatur BE plus CE, erit per interpretationem CI in BD in BE æquale triplici solido ex CI in BC in BE, & CI in BC in CD erit æquale facto ex duplici CI in BC in BE plus duplici solido ex CI in BC in CE. Solidum igitur ex CI in BC in BE minus solido ex CI in BC in BD erit æquale solido ex CI in BC in BE minus duplici solido ex CI in BC in CE; quare solidum ex BE quadrato in EK superat solidum ex CI in BC in BE minus duplici solido ex CI in BC in CE; Quadratum igitur ex BE ad factum ex BC in BE minus duplici facto ex BC in CE habet



maio rem rationem , quam C I ad E K , id est B C ad B E ; & cubus ex B E superabit solidum ex quadrato B C in B E minus duplici facto ex B C quadrato in C E , id est (quia B E æquatur B C minus C E) cubum ex B C minus triplici facto ex B C quadrato in C E ; cu- bus autem ex B E est cubus ex B C minus C E , id est cu- bus ex B C minus triplici facto ex B C quadrato in C E plus triplici facto ex C E quadrato in B C minus cubo ex C E ; cum autem superet cubum ex B C minus triplici facto ex B C quadrato in C E , si fiat Antithesis , & tol- lantur communia , erit triplex factum ex C E quadrato in B C maius cubo ex C E , quod patet , quia B C superat C E . Quare ad Synthesim .

Syn.

Synthesis secundæ partis.

Quia triplex factum ex quadrato CE in BC superat cubum ex CE ; nam BC superat CE ; si utriq; parti addatur cubus ex BC minus triplici facto ex quadrato BC in CE minus cubo ex CE , etiam cubus ex BC minus triplici facto ex BC quadrato in CE plus triplici facto ex CE quadrato in BC minus cubo ex CE ; idest per interpretationem cubus ex BE (nam BE est æqualis BC minus CE) erit maior cubo ex BC minus triplici facto ex BC quadrato in CE , idest facto ex BC quadrato in BE minus duplo facto ex BC quadrato in CE ; ergo BE quadratum ad factum ex BC in BE minus duplici facto ex BC in CE habebit maiorem rationem, quam BC ad BE , idest CI ad EK ; & solidum ex BE quadrato in EK erit maius solido ex BE in BC in CI minus duplici solido ex BC in CE in CI ; & quia BD æquatur triplici BC , & CD æquatur duplici BC , & CE æquatur BC minus BE , erit solidum ex BE in BC in CI minus duplici solido ex BC in CE in CI æquale solido ex CI in BD in BE minus solido ex CI in BC in CD . Quare solidum ex BE quadrato in EK maius erit solido ex CI in BD in BE minus solido ex CI in BC in CD ; & per Antithesim solidum ex CI in BC in CD maius erit solido ex CI in BD in BE minus solido ex BE quadrato in EK : Quare factum ex CI in CD ad factum ex CI in BD minus facto ex BE in EK habet maiorem rationem, quam BE ad BC ; sed quia factum ex CI in BD

est

est æquale factum ex $E K$ in $B G$, erit factum ex $C I$ in $B D$ minus factum ex $B E$ in $E K$ æquale factum ex $E K$ in $E G$: Quare factum ex $C I$ in $C D$ ad factum ex $E K$ in $E G$ habebit maiorem rationem, quam $B E$ ad $B C$; sed uti $B E$ ad $B C$, ita est $E P$ ad $C O$: ergo factum ex $C I$ in $C D$ ad factum ex $E K$ in $E G$ habet maiorem rationem, quam $E P$ ad $C O$; & factum sub extremis superabit factum sub medijs; ergo solidum ex $C I$ in $C D$ in $C O$ superabit solidum ex $E K$ in $E G$ in $E P$, quod erat demonstrandum.

Cum igitur demonstratum sit solidum, quod applicatur duabus tertijs partibus dati plani superare tam id, quod applicatur parti minori, quam sint duæ tertiæ partes dati plani, quam id, quod applicatur parti maiori cum defectu simili, similiterq; posito patet id esse omnium maximum, quod sumpsimus demonstrandum.

SCHOLIUM.

VT hæc propositio proponatur, & demonstretur per lineas homologas data rationali, aduertendum est, quando queritur maximum solidum, quod applicari possit dato plano deficiens cubo, id obtineri secto dato plano, ita, ut altero segmento in quadratum efformato, si reliquum dati plani applicetur lateri effecti quadrati; & fiat parallelepipedum, cuius basis sit reliquum dati plani, & altitudo latus effecti quadrati, id sit omnium maximum. Ut autem hæc omnia ad lineas homologas reducantur, posita linea rationali, querenda prius erit linea, quæ sit similis dato plano, iuxta ea, quæ in Isagoge docuimus, quæ erit tertia proportionalis, posita rationali prima,

¶

*Et ea, quæ potest datum planum secunda; tum etiam inueni-
da est similis quadrato segmenti dati plani, quæ erit tertia pro-
portionalis, posita rationali prima, Et ea, quæ potest segmentum
dati plani secunda, quæ si subtrahatur à simili dato plano, cum
sit ipsa minor (nam est similis ipsius parti) reliqua erit similis
reliquo dati plani: Quocirca similis dato plano diuisa erit in
duo segmenta, quorum alterum simile erit quadrato segmenti
dati plani, alterum simile reliquo. Cum autem media pro-
portionalis inter similem quadrato, Et rationalem sit similis
lateri quadrati, Et quod fit ex simili residuo plani in similem
lateri quadrati sit simile solido, quod applicatur plano deficiens
cubo; in hoc recidet questio, ut posita rationali, ita secetur
linea similis dato plano, ut similis ei, quod fit ex altero seg-
mento ducto in mediam proportionalem inter rationalem, Et
aliud segmentum sit omnium maxima; Et demonstrabimus,
tunc fore omnium maximam, quando alterum segmentum,
quod ducitur in medio loco proportionalem inter rationalem, Et
alterum segmentum fuerit alterius segmenti duplum; Quare
ita proponi poterit.*


*Eadem propositio proposita, & demon-
strata per lineas homologas, data
rationali.*

*Datis duabus rectis lineis, quarum altera, se
habens loco rationalis sit non secta, altera
verò secta utrunq; & alterum segmentum
sectæ habeat ad aliam rationem subduplicatam eius, quam habet rationalis ad al-
terum*

terum segmentum . Dico hanc fore omnium maximam , quando segmentum illud fuerit alterius duplum .



It data rationalis C , & altera B A , quæ prius



secetur in M ; ita , vt M A sit dupla ipsius B M , secundo , utcumq; in E ; ita vt B E sit maior , aut minor , quam B M , & I sit medio loco proportionalis inter C , & B M , & O inter C , & B E , & fiat , vt C ad I , ita M A ad F , & vt C ad O , ita E A ad H . Dico F superare H ; quia cum C & I , & B M , item C & O , & B E sint duæ series continuè proportionalium ab eadem incipientium habebit B M ad B E , per lemma secundum , duplicatam rationem eius , quam habet I ad O : Si igitur inter B M , & B E ponatur media proportionalis , verbigratia G , habebit B M ad G eam rationem , quam habet I ad O ; sed , per lemma septimum , B M ad G habet maiorem rationem , quam A E ad A M , ergo I ad O habebit maiorem rationem , quam A E ad A M ; tum sic

Fiat , vt O ad H , ita I ad N ; tum considerentur tres quantitates I , O , H , & aliæ tres I , N , F ,

Quia vt C ad M A ; ita I ad F , & vt O ad H , ita C ad E A , erit ratio I ad F minus ratione O ad H æqualis rationi E A ad M A , sed , vti O ad H , ita facta est ratio I ad N , ergo ratio N ad F erit æqualis rationi

rationi E A ad M A ; ergo I ad O habebit maiorem
 rationem, quam N ad F, sed vt O ad H, ita I ad N;
 ergo per rationem perturbatam I ad H habebit ma-
 iorem rationem, quam ad F; ergo F superat H, quod
 erat demonstrandum.

PROPOSITIO IV. ZETETICA.

Inuenire maximum plano planum, quod possit
 applicari datæ lineæ deficiens plano plano
 simili dato, & datum, cui debeat
 assimilari defectus sit quadrato
 quadratum.



SIT data recta B, cui applicandum sit plano
 planum deficiens quadrato quadrato, quod
 sit omnium maximum; oportebit, ita secare
 datam B, vt quod sit ex altero segmento in
 alterius segmenti cubum sit omnium maximum.

Sit rectæ B alterum segmentum A erit alterum B mi-
 nus A, & plano planum applicatum erit id, quod sit ex
 B in A cubum minus A quadrato quadrato; determi-
 nanda autem est proportio partium A, & B minus A,
 vt hoc productum sit omnium maximum.

Iuxta traditam methodum ponatur E æquale nihilo,
 & fiat alterum segmentum A plus E, & alterum B
 minus A minus E. Cubus ex A plus E erit æqualis
 cubo ex A plus triplici solido ex A quadrato in E plus
 triplici solido ex E quadrato in A plus cubo ex E, quæ
 omnia si ducantur in B minus A minus E, exurget
 plano planum ex B in A cubum plus triplici plano
 K plano

plano ex B in A quadratum in E plus triplici plano
 plano ex B in E quadratum in A plus plano plano ex
 B in E cubum minus A quadrato quadrato minus qua-
 druplici plano plano ex A cubo in E minus sextuplo
 plano plano ex E quadrato in A quadratum minus
 quadruplici plano plano ex A in E cubum minus qua-
 drato quadrato ex E; à quo facto si dematur factum ex
 B in A cubum minus A quadrato quadrato, erit reli-
 quum æquale nihilo; quare facta Antithesi triplex pla-
 no planum ex B in A quadratum in E plus triplici
 plano plano ex B in A in E quadratum plus plano pla-
 no ex B in E cubum erit æquale quadruplo plano plano
 ex A cubo in E plus sextuplo plano plano ex E qua-
 drato in A quadratum plus quadruplo plano plano ex
 A in E cubum plus E quadrato quadrato; & si omnia
 applicentur ad E; erit triplex solidum ex B in A qua-
 dratum plus triplici solido ex B in A in E plus solido
 ex B in E quadratum æquale quadruplo cubo ex A plus
 sextuplo solido ex E in A quadratum plus quadruplo
 solido ex A in E quadratum plus E cubo; & quia E
 æquatur nihilo, reiectis omnibus ijs, quæ non potue-
 runt liberari ab E; erit triplex solidum ex B in A
 quadratum æquale quadruplo cubo ex A; & si vtraq;
 pars applicetur ad A quadratum, erit triplex B æqua-
 le quadruplici A; & A, vnde efficitur quadrato qua-
 dratum erit æquale tribus ex quatuor partibus ipsius
 B; & reliqua quarta pars ipsius B erit illa, cui appli-
 candum erit maximum plano planum. Hinc

P O.

P O R I S M A.

Maximum plano planum, quod applicatur datæ lineæ deficiens quadrato quadrato est id, quod applicatur quartæ parti datæ lineæ, & quadrato quadratum, quod deficit occupat tres quartas partes datæ lineæ.


T H E O R E M A.

Omnium plano planorum ad eandem lineam applicatorum, & deficientium plano planis similibus, similiterq; positis maximum est id, quod quartæ parti datæ lineæ applicatur.

SIT data recta A B, cuius quarta pars sit A C, & A E primo superet A C, & parallelogrammum ex B C in C I sit simile parallelogrammo ex B E in E L. Fiat autem, ut quadratum ex B C ad quadratum ex B E, ita C D ad E F; erunt per definitionem primam facta ex B C in C I in C D, & ex B E in E L in E F duo plano plana similia, cum sint parallelepipeda super similibus basibus constituta, quorum altitudines sunt in duplicata ratione laterum homologorum similium basium; Quocirca facta parallelepipeda ex A C in C D in C I, & ex A E in E F in E L erunt plano plana eidem lineæ A B applicata deficientia plano planis similibus similiterq; positis, quorum factum ex A C in C D in C I applicatum est quartæ parti datæ lineæ; alterum verò scilicet factum ex A E in E F in E L applicatum est parti maiori, quam sit quarta pars datæ lineæ. Quare dico primo factum ex A C in C D in C I superare factum ex A E in E F in E L.

Analysys primæ partis .

Q Via parallelepipedum ex AC in CI in CD supponitur superare parallelepipedum ex AE in EL in EF, habebit CI ad EL maiorem rationem, quam factum ex AE in EF ad factum ex AC in CD; sed CI ad EL est, vt BC ad BE; seu per interpretationem, vt tripla AC ad triplam AC minus CE; ergo tripla AC ad triplam AC minus CE habebit maiorem rationem, quam factum ex AE in EF ad factum ex AC in CD; sed EF ad CD est, vti quadratum ex BE ad quadratum ex BC; ergo factum ex AE in EF ad factum ex AC in CD erit, vt factum ex AE in quadratum ex BE ad factum ex AC in quadratum ex BC; Quare tripla AC ad triplam AC minus CE habebit maiorem rationem, quam factum ex AE in quadratum ex BE ad factum ex AC in quadratum ex BC; sed quadratum ex BE idem est, ac quadratum ex tripla AC minus CE, idest noncuplum quadratum ex AC minus sextuplo rectangulo ex AC in CE plus quadrato ex CE; & quadratum ex BC idem est, ac quadratum ex tripla AC, idest noncuplum ipsius AC quadratum, & AE est æqualis AC plus CE; Quare per interpretationem factum ex AE in quadratum ex BE erit factum ex AC plus CE in quadratum ex tripla AC minus CE; idest noncuplum cubi ex AC plus triplo solido ex AC quadrato in CE



CE minus quintuplo solido ex AC in CE quadratum plus cubo ex CE ; factum verò ex AC in quadratum ex BC erit noncuplum cubi ipsius AC ; Quare tripla AC ad triplam AC minus CE habebit maiorem rationem, quam noncuplum cubi ex AC plus triplo solido ex AC quadrato in CE minus quintuplo solido ex AC in CE quadratum plus cubo ex CE ad noncuplum cubi ex AC ; & factum sub extremis superabit factum sub medijs; igitur vicesimum septuplum quadrato quadratum ex AC superabit vicesimum septuplum quadrato quadratum ex AC minus plano plano decies octies sumpto ex AC quadrato in quadratum CE plus octuplo plano plano ex AC in CE cubum minus quadrato quadrato ex CE ; & reiecto communi vicesimo septuplo quadrato quadrato ex AC , & facta Antithesi, erunt decem, & octo plano plana ex AC quadrato in CE quadratum maiora octuplo plano plano ex AC in CE cubum minus quadrato quadrato ex CE , & si omnia applicentur ad quadratum ex CE erunt decem, & octo quadrata ex AC maiora octuplo facto ex AC in CE minus quadrato ex CE , quod verum esse patebit ex sequenti lemmate.

L E M M A.

Datis duabus rectis lineis; ita vt altera deficiat ab alterius tripla erunt decem, & octo vnus quadrata simul sumpta maiora octuplo

plo sub ipsis rectangulo minus alterius
quadrato .

S Int duæ rectæ datæ A , & $\frac{A}{B}$
B , & B deficiat à tripla _____
ipsius A . Dico decem, & octo quadrata ipsius
A simul sumpta superare octuplum rectangulum ex A
in B minus quadrato ipsius B .

Plures casus habet hæc propositio, aut enim B defi-
cit ab A, aut est æqualis, aut superat, & deficit à du-
pla, aut est æqualis duplæ, aut superat duplam, sed
deficit à tripla .

Si B deficit ab A, aut est ipsi æqualis pater propo-
sitio ; nam octuplum sub ipsis rectangulum, aut deficiet
ab octo quadratis ipsius A, aut æquabit ; utcumque sit
semper deficiet à decem, & octo quadratis .

Sit B maior quam A, sed deficiat ab ipsius dupla ;
sit autem æqualis A plus I ; ergo I deficiet ab A , &
octuplum rectangulum ex A in A plus I erit æquale
octuplo quadrato ipsius A plus octuplo rectangulo ex
A in I, sed cum I deficiat ab A octuplum rectangulum
ex A in I deficiet ab octuplo quadrato ipsius A ; ergo
octuplum rectangulum ex A in A plus I deficiet à sex-
decim quadratis ipsius A ; ergo multo magis à decem,
& octo, & defectus erit maior si tollatur etiam quadra-
tum ex A plus I .


Sit B æqualis duplici A erit octuplum rectangulum
ex A in B æquale sexdecim quadratis ex A, & si aufe-
ratur quadratum ex B, idest quadruplum quadratum
ipsius A, quia B est æqualis duplici A remanebunt
qua-

quatuordecim quadrata ex A, quæ minus sunt, quam decem, & octo.

Sit B æqualis duplici A plus I, & I deficiat ab A erit octuplum rectangulum ex A in B minus B quadrato æquale duodecuplo quadrato ex A plus quadruplo rectangulo ex A in I minus quadrato ex I; & quia I deficiat ab A, etiam quadruplum rectangulum ex A in I deficiet à quadruplo quadrato ex A; quare totum deficiet à decem, & octo quadratis ex A, quod erat demonstrandum. Quare ad Synthesim.

Synthesis primæ partis.

Quia C E deficit à tripla A C, erunt decem, & octo quadrata ex A C maiora octuplo plano ex A C in C E minus quadrato ex C E, & si omnia ducantur in quadratum ex C E, erunt decem, & octo plano plana ex quadrato A C in quadratum ex C E maiora octuplo plano plano ex A C in C E cubum, minus quadrato quadrato ex C E; si



utriq; parti addatur vicesimum septuplum quadrato quadratum ex A C, & fiat Antithesis; erunt viginti septem quadrato quadrata ex A C maiora viginti septem quadrato quadratis ex A C minus decem, & octo plano planis ex quadrato A C in C E quadratum plus octuplo plano plano ex A C in C E cubum minus quadrato quadrato ex C E; & quia vicesimum septuplum quadrato quadratum ex A C fit ex tripla A C in noncuplum cubi ex A C, & vicesimum septuplum quadrato quadratum

dratum ex A C minus decem, & octo plano planis ex
 quadrato A C in C E quadratum plus octuplo plano
 plano ex A C in C E cubum minus quadrato quadra-
 to ex C E fit ex tripla A C minus C E in noncuplum
 cubi ex A C plus triplo solido ex A C quadrato in C E
 minus quintuplo solido ex A C in C E quadratum
 plus cubo ex C E; habebit tripla A C ad triplam A C
 minus C E maiorem rationem, quam noncuplum cubi
 ex A C plus triplo solido ex A C quadrato in C E
 minus quintuplo solido ex A C in C E quadratum
 plus cubo ex C E ad noncuplum cubi ex A C: & quia
 noncuplum cubi ex A C plus triplo solido ex A C qua-
 drato in C E minus quintuplo solido ex A C in C E
 quadratum plus cubo ex C E est factum ex A C plus
 C E, idest A E in quadratum ex tripla A C minus
 C E; idest B E quadratum; & noncuplum cubi ex
 A C est factum ex A C in quadratum triplæ A C,
 idest B C quadratum; habebit tripla A C, idest B C
 ad triplam A C minus C E, idest E B maiorem ra-
 tionem, quam factum ex A E in B E quadratum ad
 factum ex A C in B C quadratum; sed, ut B E qua-
 dratum ad B C quadratum, ita est E F ad C D; ergo
 B C ad B E habebit maiorem rationem, quam fa-
 ctum ex A E in E F ad factum ex A C in C D; sed
 ut B C ad B E, ita C I ad E L; ergo C I ad E L
 habebit maiorem rationem, quam factum ex A E in
 E F ad factum ex A C in C D; & factum sub extre-
 mis superabit factum sub medijs; ergo factum ex C I
 in C A in C D superabit factum ex E L in A E in
 E F, quod erat primo loco demonstrandum.

Ana-

Analysis secundæ partis.

SIT AE minor, quam AC , idest quam quarta pars totius AB , & sit ipsi AE applicatum parallelepipedum ex AE in EF in EL deficiens plano plano simili plano plano, quo deficit parallelepipedum applicatum quartæ parti ipsius AB , idest ex AC in CI in CD .


Dico secundo parallelepipedum ex AC in CI in CD superare parallelepipedum ex AE in EF in EL .

Quia parallelepipedum ex AC in CI in CD supponitur superare parallelepipedum ex AE in EF in EL , habebit CI ad EL maiorem rationem, quam factum ex AE in EF ad factum ex AC in CD ; sed

CI ad EL est, vti BC ad BE , idest, vti tripla AC ad triplam AC plus CE ; ergo tripla AC ad triplam AC plus CE habet maiorem rationem, quam factum ex AE in EF , idest (quia

AE est æqualis AC minus CE , & EF est similis quadrato ex BE , idest extripla AC plus CE) quam factum ex AC minus CE in quadratum ex tripla AC plus CE , ad factum ex AC in CD , idest (quia CD est similis quadrato ex BC , seu ex tripla AC) quam factum ex AC in quadratum triplæ AC ;

Quare tripla AC ad triplam AC plus CE habet maiorem rationem, quam noncuplum cubi ex AC minus triplo solido ex AC quadrato in CE minus quintuplo solido ex AC in CE quadratum minus cubo ex CE ad noncuplum cubi ex AC ; & factum sub




L

extremis

extremis superabit factum sub medijs . Quare vicesimum septuplum quadrato quadratum ex A C superabit vicesimum septulum quadrato quadratum ex A C minus decem, & octo plano planis ex A C quadrato in C E quadratum minus octuplo plano plano ex A C in C E cubum, minus quadrato quadrato ex C E, quod patet . Quare ad Synthesim .

Synthesis secundæ partis .

Q Via vicesimum septuplum quadrato quadratum ex A C superat vicesimum septuplum quadrato quadratum ex A C minus decem, & octo plano planis ex A C quadrato in C E quadratum minus octuplo plano plano ex A C in C E cubum minus quadrato quadrato ex C E, & vicesimum septuplum quadrato quadratum ex A C est id, quod fit ex tripla A C, idest C B in noncuplum cubi ex A C; & vicesimum septuplum quadrato quadratum ex A C minus decem, & octo plano planis ex A C quadrato in C E quadratum minus octuplo plano plano ex A C in C E cubum minus quadrato quadrato ex C E est id, quod fit ex tripla A C plus C E, idest B E in noncuplum cubum ex A C minus triplo solido ex A C quadrato in C E minus quintuplo solido ex A C in C E quadratum minus cubo ex C E, habebit C B ad B E maiorem rationem, quam noncuplum cubi ex A C minus triplo solido ex A C quadrato in C E minus quintuplo solido ex A C in C E quadratum minus cubo ex C E, idest, quam factum ex A C minus



nus

nus C E, idest A E in quadratum ex tripla A C plus C E, idest quadratum ex B E, ad noncuplum cubi ex A C, idest ad factum ex A C in quadratum triplæ A C idest in B C quadratum; habebit igitur C B ad B E maiorem rationem, quam factum ex A E in quadratum ex B E ad factum ex A C in quadratum ex B C; sed vt quadratum ex B E ad quadratum ex B C, ita est ex constructione E F ad C D; ergo factum ex A E in quadratum ex B E ad factum ex A C in quadratum ex B C erit, vt factum ex A E in E F ad factum ex A C in C D; ergo C B ad B E habebit maiorem rationem, quam factum ex A E in E F ad factum ex A C in C D; sed vt C B ad B E, ita est C I ad E L; ergo C I ad E L habebit maiorem rationem, quam factum ex A E in E F ad factum ex A C in C D, & factum sub extremis superabit factum sub medijs; factum igitur ex C I in A C in C D superabit factum ex E L in A E in E F, quod erat demonstrandum.

Cum igitur plano planum, quod applicatur quartæ parti datæ rectæ superet, tam plano planum, quod applicatur parti maiori, quam sit quarta pars, quam illud, quod applicatur parti minori cum simili defectu, erit omnium maximū, quod proposuimus demonstrandum.

S C H O L I V M.

VT hæc propositio exhibeatur per lineas homologas data rationali; Cum datarum altera ita secunda sit, vt plano planum, quod fit ex altero segmento in alterius segmenti cubum sit omnium maximum, prius inuenienda erit similis


L 2

cubo

cubo alterius segmenti, quæ erit illa, ad quam rationalis habet triplicatam rationem eius, quam habet ad segmentum; Quare similis facto ex uno segmento in cubum alterius segmenti erit illa, ad quam unum ex segmentis habebit illam rationem, quam habet rationalis ad similem cubo alterius segmenti, idest triplicatam eius, quam habet ad segmentum.

Eadem propositio proposita, & demonstrata per lineas homologas data rationali.

Datis duabus rectis lineis, quarum altera non secta se habeat loco rationalis; altera verò secta sit utcumque, & alterum segmentum sectæ habeat ad aliam lineam rationem triplicatam eius, quam habet non secta ad alterum segmentum; Dico hanc lineam fore omnium maximam, quando segmentum ad quod refertur non secta æquabit tres quartas partes datæ rectæ, vel fuerit triplum alterius segmenti.



SIT data rationalis C, & altera A B, quæ prius secetur in M; ita ut A M sit tripla ipsius B M, secundo utcumque in E; ita ut B E sit maior, aut minor, quam

quam $B M$, & fiat, ut C ad $A M$, ita $A M$ ad F , & F ad G ; & ut C ad G , ita $B M$ ad H ; habebit $B M$ ad H rationem triplicatam eius, quam habet C ad $A M$; fiat iterum ut C ad $A E$, ita $A E$ ad I , & I ad L ; & ut C ad L , ita $B E$ ad K ; habebit $B E$ ad K rationem triplicatam eius, quam habet C ad $A E$: Quia autem $A M$ æquatur tribus ex quatuor partibus datæ $A B$, vel quod idem est, est tripla ipsius $M B$. Dico H superare K .

Fiat ut G ad H , ita L ad M ; tum considerentur tres quantitates L , & G , & H , item aliæ tres L , & M , & K ; ita, ut ratio L ad H sit composita ex ratione L ad G , & ex ratione G ad H ; ratio verò L ad K sit composita ex ratione L ad M , & M ad K . Quia ab eadem C sunt duæ series continuè proportionalium C , & $A M$, & F , & G ; item C , & $A E$, & I , & L habebit, per lemma secundum, L ad G triplicatam rationem eius, quam habet $A E$ ad $A M$; sed, ex lemmate octavo, $B M$ ad $B E$ habet maiorem rationem, quam sit ratio triplicata $A E$ ad $A M$; ergo $B M$ ad $B E$ habebit maiorem rationem, quam L ad G ; sed quia per constructionem, ut C ad L , ita $B E$ ad K , erit, ut C ad $B E$, ita L ad K ; item quia per constructionem, ut C ad G , ita $B M$ ad H , erit, ut C ad $B M$, ita G ad H ; sed ut G ad H , ita facta est L ad M ; erit igitur L ad M , ut C ad $B M$; sed quia ut C ad $B E$, ita L ad K , erit M ad K , ut $B M$ ad $B E$; ergo M ad K habebit maiorem rationem, quam L ad G ; sed quia, ut G ad H ; ita L ad M , erit per rationem perturbatam, ratio L ad K maior, quam L ad H ; ergo H superat K , quod erat probandum.

PRO.

PROPOSITIO V. ZETETICA.

Inuenire maximum plano planum, quod possit
applicari dato plano cum defectu plano
plani similis dato, & datum, cui debeat
assimilari defectus sit quadrato
quadratum.



SIT datum B planum, cui sit applicandum
plano planum deficiens quadrato quadra-
to, quod sit omnium maximum. Cum pla-
no plani segmentum futurum sit quadra-
tum, vnde componatur quadrato quadratum deficiens.
Sit A cui applicetur B planum, ex quo si fiat quadra-
tum erit reliquum B plani B planum minus A quadrato,
quod ductum in A quadratum producet plano planum
ex B plano in A quadratum minus A quadrato qua-
drato, quod erit plano planum applicatum cum defectu
quadrato quadrati.


Iterum loco ipsius A sumatur A plus E, & E iuxta
hanc methodum æquetur nihilo, & si ex A plus E fiat
quadratum illud erit æquale quadrato ex A plus duplici
plano ex A in E, plus quadrato ex E, quod si detra-
hatur à B plano erit reliquum B planum minus qua-
drato ex A minus duplici plano ex A in E minus qua-
drato ex E. Quod ductum in A quadratum plus duplici
plano ex A in E plus E quadrato producet plano pla-
num ex B plano in A quadratum plus duplici plano
plano ex B plano in planum ex A in E plus plano
plano ex B plano in E quadratum minus quadrato qua-
drato

drato ex A minus quadruplo plano plano ex A cubo
 in E minus sextuplo plano plano ex A quadrato in E
 quadratum minus quadruplo plano plano ex A in E
 cubum minus E quadrato quadrato. Vnde si dematur
 superius factum, idest plano planum ex B plano in A
 quadratum minus A quadrato quadrato, reliquum erit
 duplex plano planum ex B plano in planum ex A in E
 plus plano plano ex B plano in E quadratum minus
 quadruplo plano plano ex A cubo in E minus sextu-
 plo plano plano ex A quadrato in E quadratum minus
 quadruplo plano plano ex A in E cubum minus E qua-
 drato quadrato æquale nihilo; Quare facta Antithesi
 erit duplex plano planum ex B plano in planum ex A
 in E vna cum plano plano ex B plano in E quadratum
 æquale quadruplo plano plano ex A cubo in E plus
 sextuplo plano plano ex A quadrato in E quadratum
 plus quadruplo plano plano ex A in E cubum plus E
 quadrato quadrato; & si omnia applicentur ad E erit
 duplex factum ex B plano in A vna cum facto ex B
 plano in E æquale quadruplo cubo ex A plus sextuplo
 facto ex A quadrato in E plus quadruplo facto ex A
 in E quadratum plus E cubo; & reiectis omnibus ijs,
 quæ sunt sub E, nam æquantur nihilo, erit duplex fa-
 ctum ex B plano in A æquale quadruplici cubo ex A; &
 si omnia applicentur ad A, erit duplex B planum æqua-
 le quadruplo quadrato ex A; quare A quadratum oc-
 cupat dimidium dati plani, & plano planum, quod ap-
 plicatur dato plano deficiens quadrato quadrato est id,
 quod applicatur dimidio dati plani, quod idem est ac
 duabus ex quatuor partibus dati plani: Hinc

PO.

T H E O R E M A.

SIT planum datum GA , seu CI in AB , & ei æquale MA seu EL in AQ ; & AB diuisa sit bifariam in C , erit factum ex AC in CI dimidium dati plani, cui sit simile factum ex AE in EL , & AE sit primo minor, quam AC , & vt qua-



lelepipedium ex CD in CI in CB plano planum applicatum dimidio plani dati CI in AB ; parallelepipedium vero ex EF in EL in EQ erit plano planum applicatum parti maiori, quam sit dimidium dati plani, & vtrumque deficiet plano plano simili, similiterq; posito. Dico pri-
mo

mo parallelepipedum ex CD in CI in CB superare
parallelepipedum ex EF in EL , in EQ .


Analysis primæ partis.

Quia parallelepipedum ex CD in CI in CB dicitur superare parallelepipedum ex EF in EL in EQ , habebit factum, ex CI in CB ad factum ex EL in EQ maiorem rationem, quam EF ad CD , sed EF ad CD est, uti quadratum, ex AE ad quadratum ex AC ; ergo factum ex CI in CB ad factum ex EL in EQ habebit maiorem rationem, quam quadratum ex AE ad quadratum ex AC ; quia verò factum ex EL in EQ est æquale facto ex CI in AB minus facto ex AE in EL , habebit factum ex CI in CB ad factum ex CI in AB minus facto ex AE in EL maiorem rationem, quam quadratum ex AE ad quadratum ex AC , & factum sub extremis superabit factum sub medijs; factum igitur ex quadrato AC in CI in CB superabit factum ex quadrato AE in CI in AB minus facto ex cubo AE in EL ; idest, quia CB est æqualis AC , factum ex cubo AC in CI superabit factum ex quadrato AE in duplicem AC in CI minus facto ex cubo AE in EL ; Quia autem AE est æqualis AC minus CE , erit quadratum ex AE æquale quadrato ex AC minus duplici rectangulo ex AC in CE plus quadrato ex CE , & cubus ex AE erit æqualis cubo, ex AC minus triplo solido ex AC quadrato in CE plus triplici solido ex CE quadrato in AC minus cubo ex CE ; Quare interpretando factum ex quadrato AE in duplicem AC in CI minus facto

M

ex

ex cubo A E in E L erit æquale facto ex duplici A C
 cubo in C I minus quadruplo facto ex A C quadrato
 in C E in C I plus duplici facto ex A C in C I in C E
 quadratum minus facto ex A C cubo in E L plus tri-
 plo facto ex A C quadrato in C E in E L minus triplo
 facto ex A C in C E quadratum in E L plus facto ex
 C E cubo in E L. Factum igitur ex cubo A C in C I
 superabit factum ex duplici cubo ex A C in C I minus
 quadruplo facto ex A C quadrato in C I in C E plus
 duplici facto ex A C in C I in C E quadratum minus
 facto ex A C cubo in E L plus triplo facto ex A C
 quadrato in C E in E L minus triplo facto ex A C in



C E qua-
 dratum in
 E L plus fa-
 cto ex C E
 cubo in E
 L; & facta
 Antithesi erit quadruplum factum ex A C quadrato in
 C I in C E minus facto ex A C cubo in C I minus
 facto ex duplici A C in C I in C E quadratum ma-
 ius triplici facto ex A C quadrato in C E in E L mi-
 nus facto ex cubo A C in E L minus triplici facto ex
 A C in C E quadratum in E L plus facto ex cubo C E
 in E L. Quamobrem C I ad E L habebit maiorem
 rationem, quam triplex factum ex A C quadrato in C E
 minus cubo ex A C minus triplo facto ex A C in C E
 quadratum plus cubo ex C E ad quadruplum factum
 ex A C quadrato in C E minus cubo ex A C minus
 duplici facto ex A C in C E quadratum; sed, uti C I
 ad

ad EL, ita est AC ad AE, idest AC ad AC minus CE; ergo AC ad AC minus CE habebit maiorem rationem, quam triplex factum ex AC quadrato in CE minus cubo ex AC minus triplo facto ex AC in CE quadratum plus cubo ex CE, ad quadruplum factum ex AC quadrato in CE minus cubo ex AC minus duplici facto ex AC in CE quadratum; & factum sub extremis superabit factum sub medijs: Quadruplum igitur factum ex cubo AC in CE minus quadrato quadrato ex AC minus duplici facto ex AC quadrato in CE quadratum superabit quadruplum factum ex AC cubo in CE minus sextuplo facto ex AC quadrato in CE quadratum minus quadrato quadrato ex AC plus quadruplo facto ex AC in CE cubum minus quadrato quadrato ex CE; & additis vtriq; parti quadrato quadrato ex AC yna cum duplici facto ex AC quadrato in CE quadratum, erit quadruplum factum ex cubo AC in CE maius quadruplo facto ex cubo AC in CE minus quadruplo facto ex AC quadrato in CE quadratum plus quadruplo facto ex AC in CE cubum minus quadrato quadrato ex CE; & facta Antithesis erit quadruplum factum ex AC quadrato in CE quadratum plus quadrato quadrato ex CE maius quadruplo facto ex AC in CE cubum; & si omnia applicentur ad CE quadratum, erit quadruplum quadratum ex AC plus quadrato ex CE maius quadruplo facto ex AC in CE, quod patet; nam cum AC superet CE, quadruplum quadratum ex AC superabit quadruplum factum ex AC in CE, & multo magis si quadruplo quadrato ex AC addatur quadratum ex CE. Quare ad Synthesim.

M 2

Syn-

AC in CE quadratum superabit factum ex AC minus CE in triplex factum ex AC quadrato in CE minus cubo ex AC minus triplo facto ex AC in CE quadratum plus cubo ex CE ; ergo AC ad AC minus CE , idest AE habebit maiorem rationem, quam triplex factum ex AC quadrato in CE minus cubo ex AC minus triplo facto ex AC in CE quadratum plus cubo ex CE ad quadruplum factum ex AC quadrato in CE minus cubo ex AC minus duplici facto ex AC in CE quadratum; sed ut AC ad AE , ita est CI ad EL ; habebit igitur CI ad EL maiorem rationem, quam triplex factum ex AC quadrato in CE minus cubo ex AC minus triplo facto ex AC in CE quadratum plus cubo ex CE ad quadruplum factum ex AC quadrato in CE minus cubo ex AC minus duplici facto ex AC in CE quadratum; Quare factum sub extremis superabit factum sub medijs; quadruplum igitur factum ex AC quadrato in CE in CI minus facto ex AC cubo in CI minus facto ex duplici AC in CI in CE quadratum superabit triplex factum ex AC quadrato in CE in EL minus facto ex cubo AC in EL minus triplici facto ex AC in CE quadratum in EL plus facto ex cubo CE in EL . Vtriq; parti addatur duplex factum ex AC cubo in CI , erit factum ex AC cubo in CI plus quadruplo facto ex AC quadrato in CE in CI minus duplici facto ex AC in CI in CE quadratum maius duplici facto ex AC cubo in CI plus triplo facto ex AC quadrato in CE in EL minus facto ex cubo AC in EL minus triplici facto ex AC in CE quadratum in EL plus facto ex cubo

cubo CE in EL ; & facta Antithesi erit factum ex cubo AC in CI maius duplici facto ex cubo AC in CI minus quadruplo facto ex AC quadrato in CI in CE plus duplici facto ex AC in CI in CE quadratum minus facto ex AC cubo in EL plus triplici facto ex AC quadrato in CE in EL minus triplo facto ex AC in CE quadratum in EL plus facto ex CE cubo in EL , idest facto ex quadrato ipsius AC minus CE , idest AE , in duplicem AC in CI minus facto ex cubo ipsius AC minus CE , idest AE in EL . Igitur factum ex cubo AC in CI superabit duplex factum ex quadrato AE in AC in CI minus facto ex AE cubo in EL ; idest, quia CB est æqualis AC factum ex AC quadrato in CI in CB superabit factum ex quadrato AE in CI in AB , minus facto ex cubo AE in EL . Ergo factum ex CI in CB ad factum ex CI in AB minus facto ex AE in EL habebit maiorem rationem, quam quadratum ex AE ad quadratū ex AC , idest per constructionem, quam EF ad CD ; sed factum ex CI in AB minus facto ex AE in EL est æquale facto ex EL in EQ . Ergo factum ex CI in CB ad factum ex EL in EQ habebit maiorem rationem, quam EF ad CD ; & factum sub extremis superabit factum sub medijs. Factum igitur ex CI in CB in CD superabit factum ex EL in EF in EQ , quod erat primo loco probandum, quando applicatio sit parti maiori dati plani, quam sit ipsius pars dimidia; Quare.

Sit secundo planum datum GA , seu CI in AB , & ei æquale MA , seu EL in AQ , & AB diuisa sit
bi-


bisariam in C , erit factum ex AC in CI dimidium
 dati plani, cui sit simile factum ex AE in EL , & AE
 excedat AC , &, ut quadratum ex AE ad qua-
 dratum ex AC , ita sit EF ad CD , erit paralle-
 lepipedium ex CD in
 CI in CB plano pla-
 num applicatum dimi-
 dio plani dati CI in
 AB : parallelepipedum
 verò ex EF in EL in
 EQ erit plano planum
 applicatum parti minori, quam sit dimidium dati pla-
 ni, & utrumq; deficiet plano plano simili, similiterq;
 posito; Quamobrem

Dico secundo parallelepipedum ex CD in CI in
 CB superare parallelepipedum ex EF in EL in EQ .

Analysis secundæ partis.

Quia parallelepipedum ex CD in CI in CB
 dicitur superare parallelepipedum ex EF in
 EL in EQ , habebit factum ex CI in CB ad factum
 ex EL in EQ , maiorem rationem, quam EF ad CD ,
 sed EF ad CD est, uti quadratum ex AE ad qua-
 dratum ex AC ; ergo factum ex CI in CB ad factum
 ex EL in EQ habebit maiorem rationem, quam qua-
 dratum ex AE ad quadratum ex AC ; quia verò fa-
 ctum ex EL in EQ est æquale facto ex CI in AB
 minus facto ex AE in EL , habebit factum ex CI
 in CB ad factum ex CI in AB minus facto ex AE
 in EL maiorem rationem, quam quadratum ex AE
 ad

ad quadratum ex AC , & factum sub extremis superabit
factum sub medijs. Factum igitur ex quadrato AC
in CI in CB superabit factum ex quadrato AE in CI
in AB minus facto ex cubo AE in EL , idest, quia
 CB est æqualis AC , factum ex cubo AC in CI su-
perabit factum ex quadrato AE in duplicem AC
in CI minus facto ex cubo AE in EL ; Quia autem
 AE est æqualis AC plus CE , erit quadratum ex AE
æquale quadrato ex AC plus duplici rectangulo ex
 AC in CE plus quadrato ex CE , & cubus ex AE
erit æqualis cubo ex AC plus triplo solido ex AC
quadrato in CE plus triplo solido ex CE quadrato



in AC plus cubo ex
 CE . Quare interpre-
tando factum ex qua-
drato AE in duplicem
 AC in CI minus fa-
cto ex cubo AE in EL
erit æquale facto ex du-
plici AC cubo in CI plus quadruplo facto ex AC
quadrato in CI in CE plus duplici facto ex AC in
 CI in CE quadratum minus facto ex cubo AC in
 EL minus triplo facto ex AC quadrato in CE in
 EL minus triplo facto ex AC in CE quadratum in
 EL minus facto ex CE cubo in EL ; factum igitur ex
cubo AC in CI superabit factum ex duplici cubo ex
 AC in CI plus quadruplo facto ex AC quadrato
in CI in CE plus duplici facto ex AC in CI in
 CE quadratum minus facto ex cubo AC in EL mi-
nus triplo facto ex AC quadrato in CE in EL minus
triplo


triplo facto ex A C in C E quadratum in E L minus
facto ex C E cubo in E L; & per Antithesim factum ex
cubo A C in E L plus triplo facto ex A C quadrato
in C E in E L plus triplo facto ex A C in C E qua-
dratum in E L plus facto ex cubo C E in E L supera-
bit factum ex cubo A C in C I plus quadruplo facto
ex A C quadrato in C I in C E plus duplo facto ex
A C in C I in C E quadratum. Quamobrem E L ad
C I habebit maiorem rationem, quam cubus ex A C
plus quadruplo facto ex A C quadrato in C E plus
duplici facto ex A C in C E quadratum ad cubum ex
A C plus triplo facto ex A C quadrato in C E plus
triplo facto ex A C in C E quadratum plus cubo ex
C E; sed, vt E L ad C I, ita est A E, idest A C
plus C E ad A C; idcirco A C plus C E ad A C
habebit maiorem rationem, quam cubus ex A C plus
quadruplo facto ex A C quadrato in C E plus duplo
facto ex A C in C E quadratum ad cubum ex A C
plus triplo facto ex A C quadrato in C E plus triplo
facto ex A C in C E quadratum plus cubo ex C E;
& factum sub extremis superabit factum sub medijs.
Igitur quadrato quadratum ex A C plus quadruplo
facto ex A C cubo in C E plus sextuplo facto ex A C
quadrato in C E quadratum plus quadruplo facto ex
C E cubo in A C plus quadrato quadrato ex C E
superabit quadrato quadratum ex A C plus quadruplo
facto ex A C cubo in C E plus duplici facto ex A C
in C E cubum, quod cum per se pateat, idcirco sit.

N

Syn-

Synthesis secundæ partis.

Q Via quadrato quadratum ex AC plus quadruplo facto ex AC cubo in CE plus sextuplo facto ex AC quadrato in CE quadratum plus quadruplo facto ex CE cubo in AC plus quadrato quadrato ex CE superat quadrato quadratum ex AC plus quadruplo facto ex AC cubo in CE plus duplici facto ex AC in CE cubum habebit factum ex AC plus CE ad AC maiorem rationem, quam cubus ex AC plus quadruplo facto ex AC quadrato in CE plus duplo facto ex AC in CE quadratum ad cubum ex AC plus triplo facto ex AC quadrato in CE plus triplo facto ex AC in CE quadratum plus cubo ex CE ; sed ut



ita EL ad CI ; ergo EL ad CI habebit maiorem rationem, quã cubus ex AC plus quadruplo facto ex AC quadrato in CE plus duplo facto ex AC in CE quadratum ad cubum ex AC plus triplo facto ex AC quadrato in CE plus triplo facto ex AC in CE quadratum plus cubo ex CE , & factum sub extremis superabit factum sub medijs; quare factum ex cubo AC in EL plus triplo facto ex AC quadrato in CE in EL plus triplo facto ex AC in CE quadratum in EL plus facto ex cubo ex CE in EL superabit factum ex cubo AC in CI plus quadruplo facto ex AC quadrato in

in

in C E in C I plus duplo facto ex A C in C E quadratum in C I. Vtriq; termino addatur cubus ex A C in C I, & fiat Antithesis, erit factum ex cubo A C in C I maius duplici facto ex cubo A C in C I plus quadruplo facto ex A C quadrato in C E in C I plus duplo facto ex A C in C E quadratum in C I minus facto ex cubo A C in E L minus triplo facto ex A C quadrato in C E in E L minus triplo facto ex A C in C E quadratum in E L minus facto ex cubo C E in E L, idest per interpretationem id, quod fit ex quadrato ex A C plus C E, idest A E, in duplicem A C, idest A B in C I, minus eo, quod fit ex cubo eiusdem A C plus C E, idest A E in E L; Quare factum ex cubo A C in C I, idest, quia A C supponitur æqualis C B, factum ex quadrato A C in C I in C B superabit factum ex quadrato A E in A B in C I minus facto ex cubo A E in E L; Quare factum ex C I in C B ad factum ex A B in C I minus A E in E L habebit maiorem rationem, quam quadratum ex A E ad quadratum ex A C; sed, vt quadratum ex A E ad quadratum ex A C, ita E F ad C D, & factum ex A B in C I minus facto ex A E in E L est æquale facto ex E L in E Q; ergo factum ex C I in C B ad factum ex E L in E Q habet maiorem rationem, quam E F ad C D; quocirca factum ex C I in C B in C D superabit factum ex E F in E L in E Q, quod erat demonstrandum. Cum igitur tam plano planum, quod applicatur dimidio dati plani superet, tam id, quod applicatur maiori parti, quam sit dimidium, quam id quod applicatur minori cum defectu simili, similiterq; posito patet esse omnium maximum, quod sumpsimus probandum.

SCHOLIVM.

VT hec propositio exhibetur per lineas homologas data rationali in id recidet, ut reperiatur similis dato plano, quæ ita secetur, ut quod fit sub segmentis sit omnium maximum. Sed ad propositionem primam docuimus id esse, quando linea secatur bifariam; quocirca ne eadem frustra repetam eo remitto lectores, ibi enim demonstratur. Postea rationali, & linea, quæ secetur vicinque si fiat, ut rationalis ad alterum segmentum, ita alterum segmentum ad aliam, hanc fore omnium maximam, quando segmenta erunt equalia; nam linea, quæ secatur in hac propositione est, ea, quæ facta est similis dato plano, & alterum ipsius segmentum referet partem dati plani in quadratum efficit, & ultima inuenta referet factum plano planum ex partibus plani in se ductis.

PROPOSITIO VI. ZETETICA.

Inuenire maximum plano planum, quod possit applicari dato solido cum defectu plano plani similis dato, & datum, cui debeat assimilari defectus sit quadrato quadratum,

SIT datum B solidum, cui sit applicandum plano planum deficiens quadrato quadrato, quod sit omnium maximum; Cum solidi segmentum, quod effingi debet in quadrato quadratum deficiens necesse sit, ut sit cubus. Sit igitur A, cui applicetur B solidum, ex quo si fiat cubus, erit reliquum B solidum minus cubo ex A, quod ductum
in

in A producet plano planum ex B solido in A minus quadrato quadrato ex A, quod erit plano planum applicatum cum defectu A quadrato quadrati.

Iterum loco ipsius A sumatur A plus E, & E iuxta hanc methodum æquetur nihilo, erit plano planum applicatum deficiens quadrato quadrato plano planum ex B solido in A plus plano plano ex B solido in E minus quadrato quadrato ex A minus quadruplo plano plano ex A cubo in E minus sextuplo plano plano ex A quadrato in E quadratum minus quadruplo plano plano ex A in E cubum minus quadrato quadrato ex E; Vnde si dematur superius factum, erit differentia plano planum ex B solido in E minus quadruplo plano plano ex A cubo in E minus sextuplo plano plano ex A quadrato in E quadratum minus quadruplo plano plano ex A in E cubum minus quadrato quadrato ex E, quæ æquabitur nihilo; & facta Antithesi, & omnibus applicatis ad E, erit B solidum æquale quadruplo A cubo plus sextuplo solido ex A quadrato in E plus quadruplo solido ex A in E quadratum plus cubo ex E; & reiectis ijs, quæ sub E; nam æquantur nihilo, erit B solidum æquale quadruplo A cubo, & quarta pars B solidi æquabitur cubo ex A, ex quo effingi debet quadrato quadratum; & plano planum deficiens quadrato quadrato applicabitur tribus ex quatuor partibus dati solidi. Hinc

P O R I S M A.

Maximum plano planum, quod applicatur dato solido deficiens quadrato quadrato est id, quod applicatur tribus ex quatuor partibus dati solidi, & quadrato quadratum, quod deficit occupat reliquam quartam partem.

THEO.

quod est applicatum tribus ex quatuor partibus dati solidi superare parallelepipedum ex EL in EF in EQ , quod est applicatum parti maiori, quam sint tres ex quatuor partibus dati solidi, cum ipsorum defectus sint plano plana similia, similiterq; posita.

Analysis primæ partis.

Q Via factum ex CI in CB in CG dicitur superare factum ex EL in EF in EQ habebit factum ex CI in CB ad factum ex EL in EQ maiorem rationem, quam EF ad CG , hoc est, quam quadratum ex AE ad quadratum ex AC per constructionem; sed quadratum ex AE ad quadratum ex AC habet eam rationem, quam habet quadratum ex EF ad quadratum ex CD , similes enim sunt AE , & AC duabus EF , & CD ; ergo factum ex CI in CB ad factum ex EL in EQ habet maiorem rationem, quam quadratum ex EF ad quadratum ex CD , & factum sub extremis superabit factum sub medijs; factum igitur ex CI in CB in CD quadratum superabit factum ex EL in EQ in EF quadratum; sed quia factum ex CI in CD in AB factum est æquale facto ex EL in EF in AQ , erit factum ex EL in EQ in EF æquale facto ex CI in CD in AB minus facto ex AE in EL in EF , & factum ex EL in EQ in EF quadratum erit æquale facto ex CI in CD in AB in EF minus facto ex AE in EL in EF quadratum. Quare factum ex CI in CB in CD quadratum superabit factum ex CI in CD in AB in EF minus facto ex AE in EL in EF quadratum. Quia verò CB
per

& cubus ex A E ad factum ex quadruplo quadrato
 A C in A E minus triplo cubo ex A C habebit maio-
 rem rationem, quam C I ad E L, seu quam A C ad
 A E; & ideò quadrato quadratum ex A E superabit
 factum ex quadruplo cubo ex A C in A E minus tri-
 plo quadrato quadrato ex A C; quia autem A E est
 æqualis A C minus C E, fiat interpretatio, & erit
 quadrato quadratum ex A C minus C E, idest qua-
 drato quadratum ex A C minus quadruplo facto ex
 A C cubo in C E plus sextuplo facto ex A C qua-
 drato in C E quadratum minus quadruplo facto ex A C
 in C E cubum plus quadrato quadrato ex C E maius
 facto ex quadruplo cubo ex A C in A E, idest inter-
 pretando A E in A C minus C E facto ex quadruplo
 quadrato quadrato ex A C minus quadruplo facto ex
 cubo A C in C E minus triplo quadrato quadrato ex
 A C, idest quadrato quadrato ex A C minus quadru-
 plo facto ex cubo A C in C E; & per Antithesim
 quadrato quadratum ex A C minus quadruplo facto
 ex A C cubo in C E plus sextuplo facto ex A C qua-
 drato in C E quadratum plus quadrato quadrato ex
 C E superabit quadrato quadratum ex A C minus
 quadruplo facto ex cubo A C in C E plus quadruplo
 facto ex A C in C E cubum; & reiectis communibus
 scilicet quadrato quadrato ex A C minus quadruplo
 facto ex cubo A C in C E, erit sextuplum factum ex
 A C quadrato in C E quadratum vna cum quadrato
 quadrato ex C E maius quadruplo facto ex A C in
 C E cubum; & si omnia applicentur ad quadratum
 ex C E; erit sextuplum quadratum ex A C vna cum
 qua-


O

qua-

quadrato ex CE maius quadruplo facto ex AC in
 CE , quod patet, nam AC supponitur superare CE .

Synthesis primæ partis .

Quia A C superat C E erit sextuplum quadratum ex A C una cum quadrato ex C E maius quadruplo facto ex A C in C E ; si omnia ducantur in C E quadratum , erit sextuplum factum ex A C quadrato in C E quadratum una cum quadrato quadrato ex C E maius quadruplo facto ex A C in C E cubum ; si utrique parti addatur quadrato quadratum ex A C minus quadruplo facto ex cubo A C in C E ; erit quadrato quadratum ex A C minus quadruplo facto ex cubo A C in C E una cum sextuplo facto ex A C



quadrato in C E quadratum vna cum quadrato quadrato ex C E maius quadrato quadrato ex A C minus quadruplo facto ex cubo A C in C E plus quadruplo facto ex A C in C E cubum ; & per Antithesim erit quadrato quadratum ex A C minus quadruplo facto ex cubo A C in C E plus sextuplo facto ex A C quadrato in C E quadratum minus quadruplo facto ex A C in C E cubum plus quadrato quadrato ex C E, idest per interpretationem quadrato quadratum ex A E,

(nam


(nam A E æquatur A C minus C E) maius quadrato quadrato ex A C minus quadruplo facto ex cubo A C in C E , idest per interpretationem quadruplo facto ex cubo A C in A E minus triplo quadrato quadrato ex A C . Quare cubus ex A E ad factum ex quadruplo quadrato ex A C in A E minus triplo cubo ex A C habebit maiorem rationem , quam A C ad A E , idest , quam C I ad E L ; ided factum ex cubo A E in E L superabit factum ex quadruplo quadrato ex A C in A E in C I minus triplo facto ex cubo A C in C I , & factum ex A E quadrato in E L ad factum ex quadrupla A C in A E in C I minus facto ex triplo A C quadrato in C I habebit maiorem rationem , quam A C ad A E , idest , quam C D ad E F ; & factum ex A E quadrato in E L in E F superabit factum ex quadrupla A C in C I in A E in C D minus triplo facto ex quadrato A C in C I in C D ; & per Antithesim triplum factum ex quadrato A C in C I in C D superabit factum ex quadrupla A C in C I in A E in C D minus facto ex A E quadrato in E L in E F , & factum ex tripla A C in C I in C D ad quadruplum factum ex A C in C I in C D minus facto ex A E in E L in E F habebit maiorem rationem , quam A E ad A C , seu per constructionem , quam E F ad C D ; ergo factum ex tripla A C , idest C B in C I in C D quadratum superabit factum ex quadrupla A C , idest ex A B in C D in C I in E F minus facto ex A E in E L in E F quadratum ; sed A B in C D in C I minus facto ex A E in E L in E F est æquale facto ex E F in E L in E Q ; ergo factum ex

O 2

C B

C B in C I in C D quadratum superabit factum ex E F quadrato in E L in E Q ; & factum ex C B in C I ad factum ex E L in E Q habebit maiorem rationem, quam E F quadratum ad C D quadratum, idest quam E F ad C G ; (nam per constructionem, ut quadratum ex A B ad quadratum ex A C , ita E F ad C G , & E F quadratum ad C D quadratum) Quamobrem factum ex C B in C I in C G superabit factum ex E L in E Q in E F , quod sumpsimus demonstrandum ; Quando applicatio fit parti maiori dati solidi, quam sint tres partes ipsius solidi diuisi in quatuor partes . Quare

Sit secundo datum solidum ex CI in AB in CD , cui fiat æquale solidum ex EL in EF in AQ , & AC sit sub tripla ipsius CB , erit solidum ex CI in CD in CB æquale tribus ex quatuor partibus dati solidi, & solidum ex EL in EF in EQ erit minus, quam sint tres ex quatuor partibus dati solidi, & sint solida ex AC



similibus, similiterque positis.

Dico secundo parallelepipedum ex CI in CB in CD , quod est applicatum tribus ex quatuor partibus dati solidi superare parallelepipedum ex EL in EG in EQ , quod est applicatum parti minori, quam sint tres ex quatuor partibus dati solidi, cum ipsorum defectus sint plano plana similia, similiterq; posita.

Analýsis secundæ partis.

Quia factum ex CI in CB in CD dicitur superare factum ex EL in EQ in EG , habebit factum ex CI in CB ad factum ex EL in EQ maiorem rationem, quam EG ad CD ; hoc est quam quadratum ex AE ad quadratum ex AC per constructionem; sed quadratum ex AE ad quadratum ex AC habet eam rationem, quam habet quadratum ex EF ad quadratum ex CD ; similes enim sunt AE , & AC duabus EF , & CD ; ergo factum ex CI in CB ad factum ex EL in EQ habet maiorem rationem, quam quadratum ex EF ad quadratum ex CD , & factum sub extremis superabit factum sub medijs; factum igitur ex CI in CB in CD quadratum superabit factum ex EL in EQ in EF quadratum: sed quia factum ex CI in CD in AB factum est æquale facto ex EL in EF in AQ , erit factum ex EL in EQ in EF æquale facto ex CI in CD in AB minus facto ex AE in EL in EF , & factum ex EL in EQ in EF quadratum erit æquale facto ex CI in CD in AB in EF minus facto ex AE in EL in EF quadratum. Quare factum ex CI in CB in CD quadratum

dratum

cubum ex A C ; & cubus ex A E ad factum ex quadruplo quadrato ex A C in A E minus triplo cubo ex A C habebit maiorem rationem, quam C I ad E L, seu quam A C ad A E ; & ideo quadrato quadratum ex A E superabit factum ex quadruplo cubo ex A C in A E minus triplo quadrato quadrato ex A C . Quia autem A E est æqualis A C plus C E , fiat interpretatio , & erit quadrato quadratum ex A C plus C E , idest quadrato quadratum ex A C plus quadruplo facto ex cubo A C in C E plus sextuplo facto ex A C quadrato in C E quadratum plus quadruplo facto ex A C in C E cubum plus quadrato quadrato ex C E maius facto ex quadruplo cubo ex A C in A E minus triplo quadrato quadrato ex A C , idest interpretando A E in A C plus C E facto ex quadruplo quadrato quadrato ex A C plus quadruplo facto ex cubo A C in C E minus triplo quadrato quadrato ex A C , idest quadrato quadrato ex A C plus quadruplo facto ex cubo A C in C E , quod patet . Hinc


Synthesis secundæ partis .

Quia quadrato quadratum ex A C plus quadruplo facto ex cubo A C in C E plus sextuplo facto ex A C quadrato in C E quadratum plus quadruplo facto ex A C in C E cubum plus quadrato quadrato ex C E superat quadrato quadratum ex A C plus quadruplo facto ex cubo A C in C E , idest (interpretando A C plus C E in A E) quadrato quadratum ex A E superat quadruplum factum ex cubo A C in A E minus triplo quadrato quadrato ex A C , habebit

bebit cubus ex A E ad factum ex quadruplo quadrato
 A C in A E minus triplo cubo ex A C maiorem ra-
 tionem, quam A C ad A E, idest, quam C I ad E L;
 Ergo factum ex cubo A E in E L superabit quadru-
 plum factum ex quadrato A C in A E in C I minus
 facto ex triplo cubo ex A C in C I; & factum ex qua-
 drato A E in E L ad factum ex quadrupla A C in
 A E in C I minus facto ex triplo quadrato A C in
 C I habebit maiorem rationem, quam A C ad A E,
 seu per constructionem C D ad E F. Quamobrem
 factum ex A E quadrato in E L in E F superabit fa-
 ctum ex quadrupla A C in A E in C I in C D minus
 facto ex triplo quadrato ex A C in C I in C D; &
 per Antithesim factum ex triplo quadrato A C in C I
 in C D superabit factum ex quadrupla A C in A E
 in C I in C D minus facto ex A E quadrato in E L
 in E F; & factum ex tripla A C in C I in C D ad
 factum ex quadrupla A C in C I in C D minus facto
 ex A E in E L in E F habebit maiorem rationem,
 quam A E ad A C, seu E F ad C D; factum igitur
 ex tripla A C in C I in C D quadratum superat fa-
 ctum ex quadrupla A C in C I in C D in E F minus
 facto ex A E in E L in E F quadratum; & quia tripla
 A C, per constructionem est æqualis C B, & quadru-
 pla A C ipsi A B, erit factum ex C B in C I in C D
 quadratum maius facto, ex A B in C I in C D in E F
 minus facto ex A E in E L in E F quadratum. Quia
 autem factum ex A B in C I in C D est æquale facto
 ex A Q in E L in E F, erit factum ex A B in C I in
 C D minus facto ex A E in E L in E F æquale facto
 ex

ex

ex $E L$ in $E F$ in $E Q$; ideo erit factum ex $C B$ in $C I$ in $C D$ quadratum maius facto ex $E L$ in $E Q$ in $E F$ quadratum, & factum ex $C B$ in $C I$ ad factum ex $E L$ in $E Q$ habebit maiorem rationem, quam $E F$ quadratum ad $C D$ quadratum; sed, ut $E F$ quadratum ad $C D$ quadratum, ita quadratum ex $A E$ ad quadratum ex $A C$ ob similitudinem linearum; & ut quadratum ex $A E$ ad quadratum ex $A C$, ita est $E G$



ad $C D$,
per constructionem,
habebit
factum ex
 $C B$ in $C I$
ad factum

ex $E L$ in $E Q$ maiorem rationem, quam $E G$ ad $C D$; & ideo factum ex $C B$ in $C I$ in $C D$ superabit factum ex $E L$ in $E G$ in $E Q$, quod erat probandum; Cum igitur plano planum, quod applicatur tribus ex quatuor partibus dati solidi superet plano planum, quod applicatur parti, tam maiori, quam minori, ea, quæ æquet tres ex quatuor partibus dati solidi, cum defectu simili, erit maximum omnium, quæ applicari possint dato solido, quod sumpsimus demonstrandum.

S C H O L I V M.

Quia tunc applicatur plano planum dato solido deficiens quadrato quadrato, quando datum solidum, ita secatur, ut si ex altero ipsius segmento efficiatur cubus, & reliquum solidi applicetur quadrato huius effecti cubi, tum exhibea-

P tur


tur quedam altitudo, quæ ad altitudinem cubi habeat eam rationem, quam habet latus cubi ad rationalem datam, & cum hac altitudine, manente eadem basi cubi, fiat parallelepipedum, hoc per ea, quæ in Isagoge docuimus, erit quadrato quadratum, cuius quadrato quadrati altitudine seruata, si terminetur reliquum applicati solidi, exurgens parallelepipedum erit plano planum applicatum deficiens quadrato quadrato: Hoc igitur plano planum applicatum deficiens quadrato quadrato erit parallelepipedum illud, ad quod habebit reliquum solidi detracto cubo eam rationem, quam habet rationalis data se gerens vice unitatis ad latus cubi, idest subtriplicatam eius, quam habet ad cubum; Quamobrem, ut hæc omnia reducantur ad lineas homologas posita rationali, querenda erit prius linea homologa dato solido, quæ erit quarta proportionalis posita rationali prima, & ea, quæ potest datum solidum secunda; tum etiam inuenienda est similis cubo dati segmenti, quæ erit quarta proportionalis, posita rationali prima, & ea, quæ potest datum segmentum secunda, quæ si subtrahatur à simili dato solido, cum sit ipsa minor; nam assimilatur parti, reliquum erit simile reliquo dati solidi, cui si constituatur consequens in ea ratione, quam habet rationalis ad similem lateri resecti cubi, hæc consequens erit similis plano plano applicato dato solido, cum defectu quadrato quadrati; & hanc demonstrabimus esse omnium maximam, quando similis cubo erit tertia pars similis reliquo segmento; hoc est, quando, si tota linea similis dato solido secetur in quatuor partes, quarta pars assimilatur cubo, & fiat, ut rationalis ad latus cubi, ita similis reliquo solidi ad aliam, seu, quod idem est tres ex quatuor partibus similis dato solido habeant ad aliam rationem subtriplicatam eius, quam habet rationalis ad reliquam quartam partem.

partem. Fateor autem in hac propositione, si construenda essent omnia, quæ adduximus recedendum esse ab Euclideanis postulatis; nam inter duas datas essent inveniendæ duæ mediæ proportionales; attamen cum ad demonstrandum sufficiat factum supponere, ab æquis Lectoribus hoc mihi concedi postulans me transferam ad propositionem.

Eadem propositio demonstrata, & proposita per lineas homologas data rationali.

Datis duabus rectis lineis, quarum altera se habens loco rationalis sit non secta; altera verò secta utcumq; & alterum segmentum sectæ habeat ad aliam rationem subtriplicatam eius, quam habet rationalis ad alterum segmentum. Dico hanc fore omnium maximam, quando segmentum illud fuerit alterius triplum.

SIT data rationalis C, & altera B A, quæ secetur



primo in M, ita, ut M A sit tripla ipsius B M; secundo, utcumq; in E; ita, ut B E sit maior, aut minor quam B M; & I sit prima duarum medio loco proportionalium inter C, & B M, & O similiter inter C, & B E; & fiat ut C ad I, ita M A ad F, &, ut C

P 2 ad

ad O, ita E A ad H. Dico F superare H.

Cum ab eadem C supponantur duæ series quatuor continuè proportionalium, quarum vna definit in B M, & altera in B E, & primæ seriei secunda est I, & alterius seriei secunda est O; habebit B M ad B E rationem triplicatam eius, quam habet I ad O, per lemma secundum; si igitur inter B M, & B E intelligantur duæ mediæ proportionales, quarum prima sit G, habebit B M ad G eam rationem, quam habet I ad O; & erit ratio B M ad G subtriplicata rationis B M ad B E; Quare per lemma decimum habebit B M ad G maiorem rationem, quam A E ad A M; tum sic.

Fiat ut O ad H, ita I ad N; & considerentur tres quantitates I, O, H, & aliæ tres I, N, F; Quia, ut C ad M A, ita I ad F, & ut O ad H, ita C ad E A, erit ratio I ad F minus ratione O ad H, æqualis rationi E A ad A M; sed uti O ad H, ita facta est I ad N; ergo ratio N ad F erit æqualis rationi E A ad M A; ergo I ad O habebit maiorem rationem quam N ad F; sed ut O ad H, ita I ad

N; ergo, per rationem perturbatam,

I ad H habebit maiorem ratio-

nem, quam ad F; ergo F

superat H, quod erat

demonstran-

dum.

PRO.

PROPOSITIO VII. ZETETICA.

Inuenire maximum plano solidum, quod fiat sub segmento datæ rectæ lineæ, & quadrato quadrato alterius segmenti, quod idem est, ac inuenire maximum plano solidum, quod applicari possit datæ lineæ deficiens quadrato cubo.

S C H O L I V M.

HIC aduertendum est quadrato cubum, iuxta Methodum Diophanteam, quam ego sequor, esse eam magnitudinem, quæ iuxta alteram methodum dicitur primum Surdesolidum, aut Relatum; quod volui monuisse, ne, sit inanibus questionibus nominis locus; licet satis, superq; fuisset me quadrato cubum non quadrati cubum dixisse, cum hac dicendi formula exprimat id, quod producit ex quadrato in cubum, non autem productum ex quadrato cubicè ducto.

SIT data recta B, cuius alterum segmentum sit A, erit alterum B minus A, & quod fit ex B, minus A in quadrato quadratum ex A, erit B, in A quadrato quadratum minus A quadrato cubo, plano solidum quæsitum.

Sit iterum alterum ipsius segmentum A plus E erit alterum B minus A minus E, fiat ex A plus E quadrato quadratum, erit quadrato quadratum ex A plus quadruplo plano plano ex A cubo in E plus sextuplo plano plano ex E quadrato in A quadratum plus quadruplo

druplo plano plano ex A in E cubum plus quadrato
 quadrato ex E, quod ductum in B minus A minus E,
 producet plano solidum ex B in A quadrato quadra-
 tum plus quadruplo plano solido ex B in A cubum in
 E plus sextuplo plano solido ex B in E quadratum in
 A quadratum plus quadruplo plano solido ex B in A
 in E cubum plus plano solido ex B in E quadrato qua-
 dratum minus quadrato cubo ex A minus quintuplo
 plano solido ex A quadrato quadrato in E minus de-
 cuplo plano solido ex E quadrato in A cubum minus
 decuplo plano solido ex A quadrato in E cubum mi-
 nus quintuplo plano solido ex A in E quadrato qua-
 dratum minus E quadrato cubo : Vnde si dematur su-
 perius factum B in A quadrato quadratum minus A
 quadrato cubo, erit residuum quadruplum plano soli-
 dum ex B in A cubum in E plus sextuplo plano solido
 ex B in E quadratum in A quadratum plus quadru-
 plo plano solido ex B in A in E cubum plus plano so-
 lido ex B in E quadrato quadratum minus quintuplo
 plano solido ex A quadrato quadrato in E minus de-
 cuplo plano solido ex E quadrato in A cubum minus
 decuplo plano solido ex A quadrato in E cubum mi-
 nus quintuplo plano solido ex A in E quadrato qua-
 dratum minus E quadrato cubo . Omnia applicentur
 ad E, & seruatis tantum ijs, quæ ab E liberentur, cum
 reliqua supponantur æqualia nihilo, & fiat Antithesis,
 erit quadruplum factum ex B in A cubum æquale quin-
 tuplo A quadrato quadrato ; & si omnia applicentur
 ad A cubum, erit quadruplum B æquale quintuplo A,
 & quatuor ex quinque partibus ipsius B erunt æquales
 ipsi

ipsi A; cum autem A sit segmentum, unde effingi debeat quadrato cubus defecturus, erit maximum plano solidum, quod applicatur ipsi B deficiens quadrato cubo, id quod applicatur quintæ parti ipsius B. Hinc

P O R I S M A.


Maximum plano solidum, quod applicatur datæ lineæ deficiens quadrato cubo est id, quod applicatur quintæ parti datæ lineæ, & quadrato cubus, qui deficit occupat reliquas quatuor ex quinque partibus datæ lineæ:

T H E O R E M A.

Omnia plano solidorum ad eandem lineam applicatorum, & deficientium plano solidis similibus, similiterq; positis maximum est id, quod quintæ parti datæ lineæ applicatur.

SIT data recta AB, cuius quinta pars sit AC, & AE primo superet AC, & parallelogrammum ex BC in CI sit simile parallelogrammo ex BE in EL. Fiat autem, ut cubus ex BC ad cubum ex BE, ita CD ad EF; erunt per definitionem secundam facta ex BC in CI in CD, & ex BE in EF in EL duo plano solida similia, cum sint parallelepipeda super similibus basibus constituta, quorum altitudines sunt in triplicata ratione laterum homologorum similium basium; Quocirca facta parallelepipeda ex AC in CI in CD, & ex AE in EL in EF erunt

erunt plano solida eidem lineæ AB applicata deficientia plano solidis similibus, similiterq; positis, quorum factum ex AC in CI in CD applicatum est quintæ parti datæ lineæ; alterum verò scilicet factum ex AE



in EF in EL applicatum est parti maiori, quam sit quinta pars datæ lineæ. Quare dico primo factum ex AC in CI in CD superare factum ex AE in EF in EL .

Analysîs primæ partis.

Quia parallelepipedum ex AC in CI in CD supponitur superare parallelepipedum ex AE in EL in EF , habebit factum ex AC in CI ad factum ex AE in EL maiorem rationem, quam EF ad CD , seu per constructionem, quam cubus ex BE , seu quadrupla AC minus CE ad cubum ex BC , seu quadrupla AC ; Quare factum ex AC in CI ad factum ex AE in EL habebit maiorem rationem, quam sexaginta quatuor cubi ex AC minus quadraginta, & octo solidis ex AC quadrato in CE plus duodecim solidis ex CE quadrato in AC minus cubo ex CE ad

ad sexaginta quatuor cubos ex $A C$; & factum sub
 extremis superabit factum sub medijs; ergo factum ex
 sexaginta quatuor quadrato quadratis ex $A C$ in $C I$
 superabit factum ex sexaginta quatuor cubis ex $A C$
 in $A E$ in $E L$ minus facto ex quadraginta octo qua-
 dratis ex $A C$ in $C E$ in $A E$ in $E L$ plus facto ex
 duodecim quadratis ex $C E$ in $A C$ in $A E$ in $E L$
 minus facto ex cubo $C E$ in $A E$ in $E L$; Idem sexa-
 ginta quatuor quadrato quadrata ex $A C$ ad factum ex
 sexaginta quatuor cubis ex $A C$ in $A E$ minus facto
 ex quadraginta, & octo quadratis ex $A C$ in $C E$ in
 $A E$ plus facto ex duodecim quadratis ex $C E$ in $A C$
 in $A E$ minus facto ex $C E$ cubo in $A E$ habebit ma-
 iorem rationem, quam $E L$ ad $C I$, idest $B E$ ad $B C$,
 idest quadrupla $A C$ minus $C E$ ad quadruplam $A C$,
 & factum sub extremis superabit factum sub medijs;
 ergo ducenti quinquaginta sex quadrato cubi ex $A C$
 superabunt factum, ex ducentis quinquaginta sex qua-
 drato quadratis ex $A C$ in $A E$ minus facto ex ducentis
 quinquaginta sex cubis ex $A C$ in $C E$ in $A E$ plus
 facto ex nonaginta sex quadratis ex $A C$ in $C E$ qua-
 dratum in $A E$ minus facto ex sexdecim cubis ex $C E$
 in $A C$ in $A E$ plus quadrato quadrato ex $C E$ in
 $A E$; idest quia $A E$ est æqualis $A C$ plus $C E$, facta
 interpretatione, ducenti quinquaginta sex quadrato
 cubi ex $A C$ superabunt ducentos quinquaginta sex
 quadrato cubos ex $A C$ minus facto ex centum sexa-
 ginta cubis ex $A C$ in $C E$ quadratum plus facto ex
 octoginta cubis ex $C E$ in $A C$ quadratum minus fa-
 cto ex quindecim quadrato quadratis ex $C E$ in $A C$
 plus

Q

plus quadrato cubo ex CE ; & si fiat Antithesis, & reiciantur communia, factum ex centum sexaginta cubis ex AC in CE quadratum plus facto ex quindecim quadrato quadratis ex CE in AC superabit factum ex octoginta cubis ex CE in AC quadratum plus quadrato cubo ex CE ; & si omnia applicentur ad quadratum ex CE , centum sexaginta cubi ex AC vna cum facto ex quindecim quadratis ex CE in AC superabunt factum ex octoginta quadratis ex AC in CE plus cubo ex CE , quod patebit ex sequenti lem-
mate.

L E M M A.

Datis duabus lineis; ita tamen, ut altera deficiat à quadrupla alterius. Dico centum sexaginta cubos vnius vna cum facto ex eadem in quindecim quadrata alterius superare factum ex octoginta quadratis eiusdem in alteram plus alterius cubo.



Int duæ lineæ C , & E , & quadrupla C superet E . C

Dico E

centum sexaginta cubos ex C , vna cum facto ex C in quindecim quadrata ex E superare factum ex octoginta quadratis ex C in E , plus cubo ex E .

Plures casus habet hæc propositio; aut enim C superat E ; aut est ipsi æqualis; aut E superat C , & dupla C superat E ; aut dupla C est æqualis E ; aut E superat duplam C , & tripla C superat E ; aut tripla C est

est æqualis E; aut E superat triplam C, & quatuor C superant E, in omnibus hisce casibus examinanda erit propositio.

Sit primo C maior, quam E, factum ex octoginta quadratis ex C in E, vna cum cubo ex E deficiet ab octoginta, & vno cubo ex C; ergo multo magis à centum sexaginta, vna cum facto ex C in quindecim quadrata ex E.

Sit secundo C æqualis E, factum ex octoginta quadratis ex C in E, vna cum cubo ex E æquabitur octoginta, & vni cubo ex C; ergo deficiet à centum sexaginta cubis ex C, vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C.

Sit tertio E maior quam C, sed duplex C superet E, factum ex octoginta quadratis ex C in E, vna cum cubo ex E deficiet à centum sexaginta cubis ex C, vna cum duplici facto ex C in E quadratum; ergo multo magis à centum sexaginta cubis ex C, vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C.

Sit quarto E æqualis duplici C, erit quadratum ex E æquale quadruplo quadrato ex C, & factum ex quindecim quadratis ex E in C æquabitur sexaginta cubis ex C; ergo centum sexaginta cubi ex C, vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C æquabunt ducentos viginti cubos ex C; factum verò ex octoginta quadratis ex C in E vna cum E cubo, æquabitur centum sexaginta, & octo cubis ex C; cum autem ducenti viginti cubi ex C superent centum sexaginta, & octo, patet propositio.

Sit quinto E maior duplici C; sed triplex C superet E; ponatur E æqualis duplici C plus A, & C su-

Q 2

peret

peret A, centum sexaginta cubi ex C plus facto ex quindecim quadratis ex E in C æquabunt ducentos viginti cubos ex C plus facto ex sexaginta quadratis ex C in A plus facto ex quindecim quadratis ex A in C; factum verò ex octoginta quadratis ex C in E vna cum cubo ex E æquabit centum sexaginta, & octo cubos ex C plus facto ex nonaginta duobus quadratis ex C in A plus sextuplo facto ex C in A quadratum plus A cubo. Dico ducentos viginti cubos ex C plus facto ex sexaginta quadratis ex C in A plus facto ex quindecim quadratis ex A in C superare centum sexaginta, & octo cubos ex C plus facto ex nonaginta duobus quadratis ex C in A plus sextuplo facto ex C in A quadratum plus A cubo; nam subductis communibus quinquaginta duo cubi ex C plus noncuplo facto ex A quadrato in C superabunt factum ex triginta duobus quadratis ex C in A plus A cubo, quod patet, quia C superat A.

Sit sexto E æqualis triplici C, centum sexaginta cubi ex C vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C æquabunt ducentos nonaginta quinque cubos ex C; & factum ex octoginta quadratis ex C in E, vna cum cubo ex E æquabit ducentos sexaginta septem cubos ex C, & cum ducenti nonaginta quinque superent ducentos sexaginta septem, patet conclusio.

Sit septimo E maior tripla C, sed minor quadrupla, idest sit æqualis triplici C plus A, & C superet A; centum sexaginta cubi ex C, vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C æquabunt ducentos nonaginta quinque cubos ex C plus facto ex nonaginta quadratis

dratis ex C in A plus facto ex quindecim quadratis
 ex A in C ; factum verò ex octoginta quadratis ex C
 in E plus E cubo æquatur ducentis sexaginta septem
 cubis ex C plus facto ex centum septem quadratis ex
 C in A plus facto ex noncuplo A quadrato in C plus
 A cubo; & ducenti nonaginta quinque cubi ex C plus
 facto ex nonaginta quadratis ex C in A plus facto ex
 quindecim quadratis ex A in C superant ducentos
 sexaginta septem cubos ex C plus facto ex centum
 septem quadratis ex C in A plus facto ex noncuplo
 A quadrato in C plus cubo ex A ; nam reiectis com-
 munibus, viginti, & octo cubi ex C plus facto ex sex-
 tuplo A quadrato in C superant factum ex decem &
 septem quadratis ex C in A plus A cubo, quod pa-
 tet, nam C superat A . Quare sit

Synthesis primæ partis.

Q Via $C E$ deficit à quadrupla $A C$, per superius
 lemma, centum sexaginta cubi ex $A C$, vna
 cum facto ex quindecim quadratis ex $C E$ in $A C$ su-
 perabunt factum ex octoginta quadratis ex $A C$ in
 $C E$, plus cubo ex $C E$; & si omnia ducantur in qua-
 dratum ex $C E$, factum ex centum sexaginta cubis ex
 $A C$ in $C E$ quadratum vna cum facto ex quindecim
 quadrato quadratis ex $C E$ in $A C$ superabit factum
 ex octoginta quadratis ex $A C$ in $C E$ cubum plus
 quadrato cubo ex $C E$; si vtriq; parti addantur ducenti
 quinquaginta sex quadrato cubi ex $A C$, & fiat Anti-
 thesis, ducenti quinquaginta sex quadrato cubi ex $A C$
 superabunt ducentos quinquaginta sex quadrato cubos

ex

sub extremis superabit factum sub medijs ; ergo factum ex sexaginta quatuor quadrato quadratis ex A C in C I superabit factum ex sexaginta quatuor cubis ex A C in A E in E L minus facto ex quadraginta octo quadratis ex A C in C E in A E in E L plus facto ex duodecim quadratis ex C E in A C in A E in E L minus facto ex cubo C E in A E in E L . Quare factum ex A C in C I ad factum ex A E in E L habebit maiorem rationem, quam sexaginta quatuor cubi ex A C minus quadraginta, & octo solidis ex A C quadrato in C E plus duodecim solidis ex C E quadrato in A C minus cubo ex C E ad sexaginta quatuor cubos ex A C, idest, quam cubus ex quadrupla A C minus C E, idest B E ad cubum ex quadrupla A C, idest B C; sed vt cubus ex B E ad cubum ex B C, ita E F ad C D per constructionem ; ergo factum ex A C in C I ad factum ex A E in E L habebit maiorem rationem, quam E F ad C D, & factum sub extremis superabit factum sub medijs : factum igitur ex A C in C I in C D superabit factum ex A E in E L in E F, quod erat primo loco demonstrandum ; Quando applicatio fit parti maiori, quam sit quinta pars datæ lineæ .

Sit secundo A C maior, quam A E, & planum ex B E in E L sit simile plano ex B C in C I; C D verò ad E F sit, vt cubus ex B C ad cubum ex B E ; erunt parallelepipeda ex B C in C I in C D, & ex B E in E L in E F plano solida similia ; Quare parallelepipeda ex A E in E L
in

in $E F$, & ex $A C$ in $C D$ in $C I$ erunt plano solida applicata datæ lineæ deficientia plano solidis similibus, similiterq; positis; Quia verò plano soli-

dum ex $A C$ in $C I$ in $C D$ est applicatum, quintæ parti da-

tæ lineæ, & plano solidum ex $A E$ in $E L$ in $E F$ est applicatum parti minori, quam sit quinta pars datæ lineæ.

Dico secundo factum ex $A C$ in $C I$ in $C D$ superare factum ex $A E$ in $E L$ in $E F$.

Analysis secundæ partis.

Quia factum ex $A C$ in $C I$ in $C D$ supponitur superare factum ex $A E$ in $E L$ in $E F$ habebit factum ex $A C$ in $C I$ ad factum ex $A E$ in $E L$ maiorem rationem, quam $E F$ ad $C D$, seu per constructionem, quam cubus ex $B E$, seu ex quadrupla $A C$ plus $C E$ ad cubum ex $B C$, seu quadrupla $A C$. Quare factum ex $A C$ in $C I$ ad factum ex $A E$ in $E L$ habebit maiorem rationem, quam sexaginta quatuor cubi ex $A C$ plus quadraginta, & octo solidis ex $A C$ quadrato in $C E$ plus duodecim solidis ex $C E$ quadrato in $A C$ plus cubo ex $C E$ ad sexaginta quatuor cubos ex $A C$; & factum sub extremis superabit factum

sub

sub


sub medijs ; Ergo factum ex sexaginta quatuor quadrato quadratis ex $A C$ in $C I$ superabit factum ex sexaginta quatuor cubis ex $A C$ in $A E$ in $E L$ plus facto ex quadraginta , & octo quadratis ex $A C$ in $C E$ in $A E$ in $E L$ plus facto ex duodecim quadratis ex $C E$ in $A C$ in $A E$ in $E L$ plus facto ex cubo $C E$ in $A E$ in $E L$; Idem sexaginta quatuor quadrato quadrata ex $A C$ ad factum ex sexaginta quatuor cubis ex $A C$ in $A E$ plus facto ex quadraginta , & octo quadratis ex $A C$ in $C E$ in $A E$ plus facto ex duodecim quadratis ex $C E$ in $A C$ in $A E$ plus facto ex cubo $C E$ in $A E$ habebit maiorem rationem , quam $E L$ ad $C I$, idest $B E$ ad $B C$, idest quadrupla $A C$ plus $C E$ ad quadruplam $A C$; & factum sub extremis superabit factum sub medijs . Ergo ducenti quinquaginta sex quadrato cubi ex $A C$ superabunt factum ex ducentis quinquaginta sex quadrato quadratis ex $A C$ in $A E$ plus facto ex ducentis quinquaginta sex cubis ex $A C$ in $C E$ in $A E$ plus facto ex nonaginta sex quadratis ex $A C$ in quadratum ex $C E$ in $A E$ plus facto ex sexdecim cubis ex $C E$ in $A C$ in $A E$ plus facto ex quadrato quadrato ex $C E$ in $A E$; idest , quia $A E$ est aequalis $A C$ minus $C E$, facta interpretatione , ducenti quinquaginta sex quadrato cubi ex $A C$ superabunt ducentos quinquaginta sex quadrato cubos ex $A C$ minus facto ex centum sexaginta cubis ex $A C$ in $C E$ quadratum minus facto ex octoginta cubis ex $C E$ in $A C$ quadratum minus facto ex quindecim quadrato quadratis ex $C E$ in $A C$ minus quadrato cubo ex $C E$, quod patet . Quare sit

R

Syn-

Synthesis secundæ partis.

Quia AE est æqualis AC minus CE erit factum ex ducentis quinquaginta sex quadrato quadratis ex AC in AE plus facto ex ducentis quinquaginta sex cubis ex AC in CE in AE plus facto ex nonaginta sex quadratis ex AC in quadratum ex CE in AE plus facto ex sexdecim cubis ex CE in AC in AE plus facto ex quadrato quadrato ex CE in AE æquale ducentis quinquaginta sex quadrato cubis ex AC minus facto ex centum sexaginta cubis ex AC in CE quadratum minus facto ex octoginta cubis ex CE



in AC quadratum minus facto ex quinde- cim qua- drato quadratis ex CE in AC minus quadrato cubo ex CE. Quare ducenti quinquaginta sex quadrato cubi ex AC superabunt factum ex ducentis quinquaginta sex quadrato quadratis ex AC in AE plus facto ex ducentis quinquaginta sex cubis ex AC in CE in AE plus facto ex nonaginta sex quadratis ex AC in quadratum ex CE in AE plus facto ex sexdecim cubis ex CE in AC in AE plus facto ex quadrato quadrato ex CE in AE; & resoluendo habebunt sexaginta quatuor quadrato quadrata ex AC ad factum

ex

ex sexaginta quatuor cubis ex $A C$ in $A E$ plus facto
 ex quadraginta, & octo quadratis ex $A C$ in $C E$ in
 $A E$ plus facto ex duodecim quadratis ex $C E$ in $A C$
 in $A E$ plus facto ex cubo $C E$ in $A E$ maiorem ra-
 tionem, quam quadrupla $A C$ plus $C E$ ad quadru-
 plam $A C$; idest, quam $B E$ ad $B C$, idest, quam
 $E L$ ad $C I$, & factum sub extremis superabit factum
 sub medijs. Ergo factum ex sexaginta quatuor qua-
 drato quadratis ex $A C$ in $C I$ superabit factum ex
 sexaginta quatuor cubis ex $A C$ in $A E$ in $E L$ plus
 facto ex quadraginta, & octo quadratis ex $A C$ in $C E$
 in $A E$ in $E L$ plus facto ex duodecim quadratis ex
 $C E$ in $A C$ in $A E$ in $E L$ plus facto ex cubo $C E$
 in $A E$ in $E L$. Quare factum ex $A C$ in $C I$ ad fa-
 ctum ex $A E$ in $E L$ habebit maiorem rationem, quam
 sexaginta quatuor cubi ex $A C$ plus quadraginta, &
 octo solidis ex $A C$ quadrato in $C E$ plus duodecim
 solidis ex $C E$ quadrato in $A C$ plus cubo ex $C E$
 ad sexaginta quatuor cubos ex $A C$; idest, per in-
 terpretationem, quam cubus ex quadrupla $A C$ plus
 $C E$, idest ex $B E$ ad cubum ex quadrupla $A C$, idest
 $B C$; sed, vt cubus ex $B E$ ad cubum ex $B C$, ita
 est, per constructionem, $E F$ ad $C D$; Ergo factum
 ex $A C$ in $C I$ ad factum ex $A E$ in $E L$ habebit ma-
 iorem rationem, quam $E F$ ad $C D$, & consequenter
 factum ex $A C$ in $C I$ in $C D$ superabit factum ex
 $A E$ in $E L$ in $E F$; ergo plano solidum, quod ap-
 plicatur quintæ parti datæ lineæ superat plano solidum,
 quod applicatur parti minori, quam sit quinta pars,
 quod erat secundo loco demonstrandum: Cum autem

demonstraverimus etiam superare id, quod applicatur parti maiori patet esse omnium maximum eorum, quæ applicari possint cum defectu simili, similiterq; posito, quod sumpsimus demonstrandum.

S C H O L I V M.


Si ponatur linea rationalis, & huius ratio ad aliam lineam datam continetur in quatuor alijs continue proportionalibus ultra rationalem, erit ultima similis quadrato quadrato data lineæ; & si hæc ducatur in aliam lineam quamcunque datam, producetur simile plano solido; Cum autem similis huic producto sit proportionalis illa, ad quam hæc ultimo loco data habeat eam rationem, quam habet rationalis ad ultimam continue proportionalium, hoc est quadruplicatam eius, quam habet ad primo datam lineam, ut apparet ex ijs, quæ in Isagoge docuimus; Hinc fit, ut eadem superior propositio per lineas homologas data rationali apte demonstretur sequenti propositione.

Eadem propositio proposita, & demonstrata per lineas homologas data rationali.

Datis duabus rectis lineis, quarum altera non secta se habeat loco rationalis; altera verò secta sit, uterunque, & alterum ipsius segmentum habeat ad aliam lineam rationem quadruplicatam eius, quam habet non secta ad alterum segmentum. Dico hanc fore omnium maximam, quando segmen-
tum,

tum, ad quod refertur non secta erit æquale
quatuor ex quinque partibus data recte
secta, vel fuerit quadruplum alterius seg-
menti.

SIT data rationalis C, & altera A B, quæ prius



fecetur in M, ita, vt A M sit quadrupla ipsius B M;
secundo utcumque in E; ita vt B E sit maior, aut mi-
nor, quam B M; & fiat, vt C ad A M, ita A M ad
F, & F ad P, & P ad G, habebit C ad G quadrupli-
catam rationem eius, quam habet ad A M; fiat ite-
rum, vt C ad A E, ita A E ad I, & I ad Q, & Q
ad L, habebit C ad L quadruplicatam rationem eius,
quam habet ad A E; tum fiat, vt C ad G, ita B M
ad H, &, vt C ad L, ita B E ad K habebit B M ad
H rationem quadruplicatam eius, quam habet C ad
A M, & B E ad K rationem quadruplicatam eius,
quam habet C ad A E; sed quia A M æquatur qua-
tuor ex quinque partibus data A B, vel quod idem
est, est quadrupla ipsius M B. Dico H superare K.

Fiat

Fiat ut G ad H , ita L ad M ; tum considerentur tres quantitates L , & G , & H , item aliae tres L , & M , & K ; ita, ut ratio L ad H sit composita ex ratione L ad G , & ex ratione G ad H ; ratio vero L ad K sit composita ex ratione L ad M , & M ad K . Quia ab eadem C sunt duae series continuè proportionalium C , & A M , & F , & P , & G ; item C , & A E , & I , & Q , & L , habebit, per lemma secundum, L ad G quadruplicatam rationem eius, quam habet A E ad A M ; sed, ex lemmate undecimo, B M ad B E habet maiorem rationem, quam sit ratio quadruplicata A E ad A M ; ergo B M ad B E habebit maiorem rationem, quam L ad G ; sed quia, per constructionem, ut C ad L , ita B E ad K , erit ut C ad B E , ita L ad K ; item quia, per constructionem, ut C ad G ; ita B M ad H erit, ut C ad B M ; ita G ad H ; sed, ut G ad H , ita facta est L ad M ; erit igitur L ad M , ut C ad B M ; sed quia ut C ad B E , ita L ad K erit M ad K , ut B M ad B E ; sed B M ad B E habet maiorem rationem, quam L ad G ; ergo M ad K habebit maiorem rationem, quam L ad G : sed quia ut G ad H , ita L ad M , erit, per rationem perturbatam, ratio L ad K maior, quam L ad H ; ergo H superat K , quod erit probandum.

PRO-

PROPOSITIO VIII. ZETETICA.

Inuenire maximum plano solidum, quod possit
applicari dato plano deficiens qua-
drato cubo.

SIT datum B planum, & oporteat facere, quod
imperatum est; ita secandum erit B planum,
vt si ex altero ipsius segmento fiat quadratum,
& ex latere huius effecti quadrati fiat cubus, quod sit ex
reliquo plani in hunc effectum cubum sit omnium maxi-
mum. Sit segmentum A quadratum, erit reliquum
plani B planum minus A quadrato, quod ductum in A
cubum producet plano solidum applicatum, idest B
planum in A cubum, minus A quadrato cubo.

Sit secundo segmentum quadratum ex A plus E, &
E æquetur nihilo; idest A quadratum plus duplici
rectangulo ex A in E plus E quadrato; erit reliquum
plani B planum, minus A quadrato minus duplici
rectangulo ex A in E minus E quadrato, quod ductum
in cubum ex A plus E, idest in cubum ex A plus tri-
plici solido ex A quadrato in E plus triplici solido ex
E quadrato in A plus E cubo, erit factum B planum
in A cubum minus A quadrato cubo minus quintuplo
A quadrato quadrato in E minus decuplo à cubo in E
quadratum plus triplo B plano in A quadratum in E
plus triplo B plano in E quadratum in A plus B plano
in E cubum minus decuplo A quadrato in E cubum
minus quintuplo E quadrato quadrato in A minus E
quadrato cubo; Vnde si dematur superius factum, idest
B pla-

B planum in A cubum minus A quadrato cubo, erit residuum triplum B planum in A quadratum in E plus triplo B plano in E quadratum in A plus B plano in E cubum minus quintuplo facto ex A quadrato quadrato in E minus decuplo facto ex A cubo in E quadratum minus decuplo facto ex A quadrato in E cubum minus quintuplo facto ex E quadrato quadrato in A minus E quadrato cubo; & si omnia applicentur ad E, & reseruat is tantum, quæ ab E liberantur, & fiat Antithesis, erit triplum B planum in A quadratum æquale quintuplo quadrato quadrato ex A; & si utraq; pars applicetur ad A quadratum, erit triplum B planum æquale quintuplo quadrato ex A, & tres partes ex quinque partibus B plani æquales erunt A quadrato; cum autem ex A quadrato efformari debeat quadrato cubus, qui sit defecturus, erit plano solidum, quod applicatur dato plano deficiens quadrato cubo id, quod applicatur reliquis duabus ex quinque partibus dati plani. Hinc Porisma

P O R I S M A.

Maximum plano solidum, quod applicatur dato plano deficiens quadrato cubo est id, quod applicatur duabus ex quinque partibus dati plani, & quadrato cubus, qui deficit occupat reliquas tres partes.

T H E O R E M A.

Omnia plano solidorum ad idem planum applicatorum, & deficientium plano solidis similibus, similiterq; positis maximum est

sint duæ ex quinque partibus dati plani. Quare

Dico primo plano solidum ex $B D$ in $D G$ in $D I$ superare plano solidum ex $Q E$ in $E F$ in $E L$.

Analysîs primæ partis.

Quia plano solidum ex $B D$ in $D G$ in $D I$ superponitur superare plano solidum ex $Q E$ in $E F$ in $E L$, habebit factum ex $B D$ in $D I$ ad factum ex $Q E$ in $E L$ maiorem rationem, quam $E F$ ad $D G$; sed factum ex $Q E$ in $E L$ est æquale facto ex $A B$ in $D I$ minus facto ex $A E$ in $E L$, & $E F$ ad $D G$ est, ut cubus ex $A E$ ad cubum ex $A D$, per constructionem; ergo factum ex $B D$ in $D I$ ad factum ex $A B$ in $D I$ minus facto ex $A E$ in $E L$ habebit maiorem rationem, quam cubus ex $A E$ ad cubum ex $A D$, & factum sub extremis superabit factum sub medijs; factum igitur ex $B D$ in $D I$ in cubum ex $A D$ superabit factum ex $A B$ in $D I$ in cubum ex $A E$ minus facto ex $A E$ quadrato quadrato in $E L$; & si fiat Antithesis, erit factum ex $A E$ quadrato quadrato in $E L$ maius facto ex $A B$ in $D I$ in $A E$ cubum, minus facto ex $B D$ in $D I$ in $A D$ cubum, & quadrato quadratum ex $A E$ ad factum ex $A B$ in $A E$ cubum minus facto ex $B D$ in $A D$ cubum habebit maiorem rationem, quam $D I$ ad $E L$, idest $A D$ ad $A E$, & factum sub extremis superabit factum sub medijs; ergo quadrato cubus ex $A E$ superabit factum ex $A B$ in $A D$ in $A E$ cubum minus facto ex $B D$ in $A D$ quadrato quadratum. Quia autem $A E$ est æqualis triplæ $A C$ minus $D E$, & $A B$ est æqualis quintuplæ $A C$, & $A D$

A D triplæ, si fiat interpretatio, ducenti quadraginta tres quadrato cubi ex A C minus factò ex quadringentis quinque quadrato quadratis ex A C in D E plus factò ex ducentis septuaginta cubis ex A C in quadratum D E minus factò ex nonaginta quadratis ex A C in cubum D E plus factò ex quindecim A C in quadrato quadratum ex D E minus quadrato cubo ex D E superabunt ducentos quadraginta tres quadrato cubos ex A C minus factò ex quadringentis quinque quadrato quadratis ex A C in D E plus factò ex centum triginta quinque cubis ex A C in D E quadratum minus factò ex quindecim quadratis ex A C in D E cubum ; & si demantur communia , & fiat Antithesis ; factum ex centum triginta quinque cubis ex A C in quadratum D E, vna cum factò ex quindecim A C in D E quadrato quadratum superabit factum ex septuaginta quinque quadratis ex A C in D E cubum plus quadrato cubo ex D E ; & si omnia applicentur ad D E quadratum centum triginta quinque cubi ex A C, vna cum factò ex quindecim quadratis ex D E in A C superabunt factum ex septuaginta quinque quadratis ex A C in D E vna cum cubo ex D E, quod patet ex sequenti lemmate.

L E M M A.

Datis duabus lineis ; ita , vt altera deficiat à tripla alterius . Dico centum triginta quinque cubos ex prima , vna cum factò ex quindecim quadratis secundæ in primam superare factum ex

S 2

sep-

septuaginta quinque quadratis primæ in secundam, vna cum cubo ex secunda.

S Int datæ duæ rectæ C, & E, $\frac{C}{E}$ & E deficiat à tripla C.

Dico centum triginta quinque cubos ex C, vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C superare factum ex septuaginta quinque quadratis ex C in E, vna cum cubo ex E.

Plures casus habet hæc propositio; aut E deficit à C, aut est æqualis, aut superat C, sed deficit ab ipsius dupla, aut est æqualis duplæ, aut superat duplam, & deficit à tripla.

Sit primo E minor quam C, factum ex septuaginta quinque quadratis ex C in E, vna cum cubo ex E deficiet à septuaginta sex cubis ex C; ergo multo magis à centum triginta quinque cubis ex C, vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C.

Sit secundo E æqualis C, erit factum ex septuaginta quinque quadratis ex C in E, vna cum cubo ex E æquale septuaginta sex cubis ex C, ergo deficiet à centum triginta quinque cubis ex C, vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C.

Sit tertio E maior C, sed minor dupla C, & supponatur æqualis C plus A, & C sit maior A; erit aggregatum ex centum triginta quinque cubis ex C, vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C æquale aggregato ex centum quinquaginta cubis ex C, vna cum facto ex triginta quadratis ex C in A plus facto ex quindecim A quadratis in C; factum verò ex septuaginta quinque quadratis ex C in E, vna cum cubo

ex

ex E erit æquale septuaginta sex cubis ex C, vna cum facto ex septuaginta, & octo quadratis ex C in A plus triplo facto ex A quadrato in C plus A cubo; si igitur aggregatum ex centum quinquaginta cubis ex C, vna cum facto ex triginta quadratis ex C in A plus facto ex quindecim A quadratis in C comparetur aggregato ex septuaginta sex cubis ex C, vna cum facto ex septuaginta octo quadratis ex C in A plus triplo facto ex A quadrato in C plus A cubo, & demantur vtrinque communia, residuum primæ partis erit aggregatum ex septuaginta quatuor cubis ex C, vna cum facto ex duodecim quadratis ex A in C, quod patet superare residuum secundæ partis, idest aggregatum ex quadraginta, & octo quadratis ex C in A plus cubo ex A: Cum enim A deficiat à C hoc aggregatum deficiet à quadraginta nouem cubis ex C, ergo multò magis à septuaginta quatuor cubis ex C, vna cum facto ex duodecim quadratis ex A in C.

Sit quarto E æqualis duplici C, erit aggregatum ex centum triginta quinque cubis ex C, vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C æquale centum nonaginta quinque cubis ex C, & aggregatum ex septuaginta quadratis ex C in E, vna cum E cubo erit æquale centum quadraginta, & octo cubis ex C. Quare patet primum superare postremum.

Sit vltimo E maior duplici C, sed deficiat ab ipsius tripla; quare supponatur æqualis duplici C plus A, & C superet A; erit aggregatum ex centum triginta quinque cubis ex C, vna cum facto ex quindecim quadratis ex E in C æquale aggregato ex centum nonaginta quinque cubis


dratis ex D E in A C maius facto ex septuaginta quinque quadratis ex A C in D E, vna cum cubo ex D E; & si omnia ducantur in D E quadratum, erit factum ex centum triginta quinque cubis ex A C in quadratum D E, vna cum facto ex quindecim A C in D E quadrato quadratum maius facto ex septuaginta quinque quadratis ex A C in D E cubum plus quadrato cubo ex D E; & per Antithesim aggregatum ex centum triginta quinque cubis ex A C in quadratum D E, vna cum facto ex quindecim A C in D E quadrato quadratum minus quadrato cubo ex D E superabit factum ex septuaginta quinque quadratis ex A C in D E cubum; & si vtrique parti addantur ducenti quadraginta tres quadrato cubi ex A C minus facto ex quadringentis quinque quadrato quadratis ex A C in D E plus facto ex centum triginta quinque cubis ex A C in D E quadratum minus facto ex nonaginta quadratis ex A C in D E cubum; aggregatum ex ducentis quinquaginta tribus quadrato cubis ex A C minus facto ex quadringentis quinque quadrato quadratis ex A C in D E plus facto ex ducentis septuaginta cubis ex A C in quadratum D E minus facto ex nonaginta quadratis ex A C in cubum D E plus facto ex quindecim A C in quadrato quadratum ex D E minus quadrato cubo ex D E superabit aggregatum ex ducentis quadraginta tribus quadrato cubis ex A C minus facto ex quadringentis quinque quadrato quadratis ex A C in D E plus facto ex centum triginta quinque cubis ex A C in D E quadratum minus facto ex quindecim quadratis ex A C in D E cubum; idest
 si fiat.

si fiat interpretatio, ut $A E$ sit æqualis triplæ $A C$ minus $D E$, & $A B$ sit æqualis quintuplæ $A C$, & $A D$ triplæ; erit quadrato cubus ex $A E$ maior factio ex $A B$ in $A D$ in $A E$ cubum minus factio ex $B D$ in $A D$ quadrato quadratum: Quare quadrato quadratum ex $A E$ ad factum ex $A B$ in $A E$ cubum minus factio ex $B D$ in $A D$ cubum habebit maiorem rationem, quam $A D$ ad $A E$, idest, quam $D I$ ad $E L$; ergo factum ex $A E$ quadrato quadrato in $E L$ superabit factum ex $A B$ in $D I$ in $A E$ cubum minus factio ex $B D$ in $D I$ in $A D$ cubum; & si fiat Antithesis, factum ex $B D$ in $D I$ in $A D$ cubum superabit factum ex $A B$ in $D I$ in $A E$ cubum minus factio ex $A E$ quadrato quadrato in $E L$; Ergo factum ex $B D$ in $D I$ ad factum ex $A B$ in $D I$ minus factio ex $A E$ in $E L$ habebit maiorem rationem, quam cubus ex $A E$ ad cubum ex $A D$; sed factum ex $A B$ in $D I$ minus factio ex $A E$ in $E L$ est æquale factio ex $Q E$ in $E L$; nam $D I$ in $A B$ æquatur factio ex $E L$ in $A Q$; &, ut cubus ex $A E$ ad cubum ex $A D$, ita $E F$ ad $D G$; habebit igitur factum ex $B D$ in $D I$ ad factum ex $Q E$ in $E L$ maiorem rationem, quam habeat $E F$ ad $D G$; ergo factum sub extremis superabit factum sub medijs; factum igitur ex $B D$ in $D I$ in $D G$ superabit factum ex $Q E$ in $E L$ in $E F$, idest plano solidum applicatum duabus ex quinque partibus dati plani superabit plano solidum applicatum parti maiori, quam sint duæ ex quinque partibus dati plani, simili existente utriusque defectu, quod erat primo loco demonstrandum.

Sic

Sit secundo datum planum AB in DI , cuius quinta pars sit AC in DI , & AD sit tripla ipsius AC , BD verò æquet reliquis duas quintas partes, & plano AB in DI sit æquale planum EL in AQ , & AE superet AD , & sint similes figuræ AE in EL , & AD in DI , & vt cubus ex AD ad cubum ex AE , ita sit DG ad EF ; erunt parallelepipeda ex AD in DG in DI , & ex AE in EF in EL plana solida

similia, & facta
ex BD in DG
in DI, & ex
QE in EF in
EL erunt plano



no applicata deficientia plano solidis similibus, simili-
terque positis . Quia autem factum ex $B D$ in $D G$
in $D I$ est applicatum duabus ex quinque partibus dati
plani, & factum ex $Q E$ in $E F$ in $E L$ est applicatum
parti minori, quam sint duæ ex quinque partibus dati
plani . Dico secundo factum ex $B D$ in $D G$ in $D I$
superare factum ex $Q E$ in $E F$ in $E L$. Sit igitur


Analyfis ſecundæ partis .

Quia factum ex BD in DG in DI supponitur
superare factum ex QE in EF in EL , habebit
factum ex BD in DI ad factum ex QE in EL maio-
rem rationem, quam habeat EF ad DG ; sed factum
ex QE in EL est æquale facto ex AB in DI minus
facto ex AE in EL ; & EF ad DG est, vt cubus
ex AE ad cubum ex AD per constructionem; Ergo

T

factum

factum ex B D in D I ad factum ex A B in D I minus
facto ex A E in E L habebit maiorem rationem, quam
cubus ex A E ad cubum ex A D; & factum sub extre-
mis superabit factum sub medijs; factum igitur ex B D
in D I in cubum ex A D superabit factum ex A B in
D I in cubum ex A E minus facto ex A E quadrato
quadrato in E L; & si fiat Antithesis, erit factum ex
A E quadrato quadrato in E L maius facto ex A B in
D I in A E cubum minus facto ex B D in D I in A D
cubum; & quadrato quadratum ex A E ad factum ex
A B in A E cubum minus facto ex B D in A D cu-
bum habebit maiorem rationem, quam D I ad E L,



id est A D ad
A E; & factum
sub extremis su-
perabit factum
sub medijs; er-
go quadrato cu-

bus ex A E superabit factum ex A B in A D in A E
cubum minus facto ex B D in A D quadrato quadratum.

Quia autem A E est æqualis triplicæ A C plus D E,
& A B est æqualis quintuplæ A C, & A D triplæ; si
fiat interpretatio, erit quadrato cubus ex A E æqualis
aggregato ex ducentis quadraginta tribus quadrato cu-
bis ex A C plus facto ex quadringentis quinque qua-
drato quadratis ex A C in D E plus facto ex ducentis
septuaginta cubis ex A C in D E quadratum plus fa-
cto ex nonaginta quadratis ex A C in D E cubum
plus facto ex quindecim A C in D E quadrato qua-
dratum plus quadrato cubo ex D E; & factum ex A B
in

in A D in A E cubum minus factum ex B D in A D
 quadrato quadratum, facta interpretatione, erit æqua-
 le aggregato ex ducentis quadraginta tribus quadrato
 cubis ex A C plus factum ex quadringentis quinque
 quadrato quadratis ex A C in D E plus factum ex cen-
 tum triginta quinque cubis ex A C in D E quadratum
 plus factum ex quindecim quadratis ex A C in D E
 cubum. Patet autem aggregatum æquale quadrato
 cubo ex A E superare hoc aggregatum; Quare sit

Synthesis secundæ partis.

Q Via aggregatum ex ducentis quadraginta tribus
 quadrato cubis ex A C plus factum ex quadrin-
 gentis quinque quadrato quadratis ex A C in D E
 plus factum ex ducentis septuaginta cubis ex A C in D E
 quadratum plus factum ex nonaginta quadratis ex A C
 in D E cubum plus factum ex quindecim A C in D E
 quadrato quadratum plus quadrato cubo ex D E su-
 perat aggregatum ex ducentis quadraginta tribus qua-
 drato cubis ex A C plus factum ex quadringentis quin-
 que quadrato quadratis ex A C in D E plus factum ex
 centum triginta quinque cubis ex A C in D E qua-
 dratum plus factum ex quindecim quadratis ex A C in
 D E cubum; idest, facta interpretatione (quia tripla
 A C plus D E est æqualis A E, & quintuplæ A C
 est æqualis A B, & triplæ A C est æqualis A D) &
 quadrato cubus ex A E superabit factum ex A B in
 A D in A E cubum minus factum ex B D in A D qua-
 drato quadratum; Idcirco quadrato quadratum ex
 A E ad factum ex A B in A E cubum minus factum

T 2

ex

ex BD in AD cubum habebit maiorem rationem, quam AD ad AE , idest, quam DI ad EL ; & factum sub extremis superabit factum sub medijs; factum igitur ex AE quadrato quadrato in EL superabit factum ex AB in DI in AE cubum minus facto ex BD in DI in AD cubum; & facta Antithesi factum ex BD in DI in AD cubum superabit factum ex AB in DI in AE cubum minus facto ex AE quadrato quadrato in EL ; & factum ex BD in DI ad factum ex AB in DI minus facto ex AE in EL habebit maiorem rationem, quam cubus ex AE ad cubum ex AD , seu quam EF ad DG , & quia factum ex AB in DI est æquale facto ex AQ in EL , erit factum ex AB in DI minus facto ex AE in EL æquale facto ex EQ in EL ; ergo factum ex BD in DI ad factum ex EQ in EL habebit maiorem rationem, quam EF ad DG , & consequenter factum ex BD in DI in DG superabit factum ex EQ in EL in EF , idest plano solidum applicatum duabus ex quinque partibus superabit plano solidum applicatum parti minori, quam sint duæ ex quinque partibus dati plani, simili existente defectu; cum autem etiam demonstratum sit superare applicatum parti maiori, quam sint duæ ex quinque partibus dati plani, patet esse omnium maximum, quod sumpsimus demonstrandum.

SCHOLIVM.

SI dentur duæ lineæ, quarum altera gerat vicem rationalis, altera verò possit datum planum, & queratur tertia proportionalis posita rationali prima, & ea, quæ potest dari

rum

tum planum secunda, tertia inuenta erit similis dato plano, cuius segmenta similia erunt segmentis dati plani, & medio loco proportionalis inter segmentum similis dato plano, & rationalem erit similis ei, quæ potest segmentum dati plani; & si fiat, ut rationalis ad similem ei, quæ potest segmentum dati plani, ita similis segmento dati plani ad aliam, hæc quarto loco inuenta erit similis cubo eius, quæ potest segmentum dati plani; & factum ex simili alteri segmento dati plani in hanc erit simile plano solido; si autem fiat, ut rationalis ad quartam prius inuentam, ita similis alteri segmento dati plani ad aliam, hæc erit similis plano solido deficienti quadrato cubo; nam, ut rationalis ad similem segmento dati plani, ita similis cubo eius, quæ potest alterum segmentum dati plani ad aliam; cum autem rationalis ad similem segmento dati plani habeat duplicatam rationem eius, quam habet ad eam, quæ potest alterum segmentum; hinc fit, ut exurgat quadrato cubus; sed, ne dum brevis esse laboro obscurus nimium fiam hæc ulterius dilucidemus.

Sint datæ duæ lineæ A , & B , & A gerat vicem rationalis; B verò possit datum planum; si fiat, ut A ad B , ita B ad C plus D , erit C plus D similis dato plano, & C , & D erunt similes segmentis dati plani.

Si iterum fiat ut A ad E , ita E ad C , & C ad F , erit E similis ei, quæ potest segmentum dati plani, cui similis est C , & F erit similis cubo ipsius E , seu cubo facto ex latere quadrati æqualis segmento dati plani in idem quadratum. Si igitur fiat, ut A ad C , ita F ad aliam, erit hæc ultima similis quadrato cubo ex E ; & si fiat, ut A ad D , quæ est similis alteri segmento, ita F ad aliam v. g. H , hæc erit similis plano solido applicato dato plano cum defectu quadrato cubi.


cubi. Quia autem A ad F habet rationem sesquiplicatam eius, quam habet A ad C ; & ut A ad F , ita D ad H , habebit D ad H rationem sesquiplicatam eius, quam habet A ad C . Hinc fit, ut eadem superior propositio per lineas homologas, data rationali apte proponatur, & demonstretur sequenti propositione: ideo fit

Eadem propositio proposita, & demonstrata per lineas homologas data rationali.

Datis duabus rectis lineis, quarum altera non secta se habeat loco rationalis, altera verò secta sit utcumq, & alterum ipsius segmentum habeat ad aliam lineam rationem sesquiplicatam eius, quam habet non secta ad alterum segmentum. Dico hanc fore omnium maximam, quando segmentum ad quod refertur non secta erit æquale tribus ex quinque partibus datæ rectæ sectæ, vel fuerit sesquialterum alterius segmenti.



IT data rationalis C , & altera $A B$, quæ prius secetur in M ; ita ut $A M$ sit sesquialtera ipsius



$M B$: secundo, utcumque in E ; ita, ut $B E$ sit maior,
aut

aut minor ipsa $B M$, & inter C , & $A M$ inueniatur medio loco proportionalis F , &, vt C ad F , ita fiat $A M$ ad G ; ita, vt sint continuè proportionales C , & F , & $A M$, & G ; vt autem C ad G , ita fiat $B M$ ad H ; Quia C ad G habet sesquiplicatam rationem eius, quam habet ad $A M$, habebit $B M$ ad H sesquiplicatam rationem eius, quam habet C ad $A M$.

Fiat iterum inter C , & $A E$ media proportionalis I , & vt C ad I , ita $A E$ ad Q : ita, vt sint continuè proportionales C , & I , & $A E$, & Q , vt autem C ad Q ita fiat $B E$ ad K , habebit C ad Q sesquiplicatam rationem eius, quam habet ad $A E$; Quare $B E$ ad K sesquiplicatam rationem habebit eius, quam habet C ad $A E$, & quia $A M$ est sesquialtera ipsius $B M$. Dico H superare K .

Fiat, vt G ad H , ita Q ad M ; tum considerentur tres quantitates Q , & G , & H ; item alia tres Q , & M , & K ; ita, vt ratio Q ad H sit composita ex ratione Q ad G , & ex ratione G ad H : ratio verò Q ad K sit composita ex ratione Q ad M , & M ad K . Quia ab eadem C sunt duæ series continuè proportionalium C & F , & $A M$, & G ; item C , & I , & $A E$, & Q , habebit Q ad G sesquiplicatam rationem eius, quam habet $A E$ ad $A M$; sed ex lemmate duodecimo $B M$ ad $B E$ habet maiorem rationem, quam sit ratio sesquuplicata $A E$ ad $A M$; ergo $B M$ ad $B E$ habebit maiorem rationem, quam Q ad G : sed quia, per constructionem, vt C ad Q , ita $B E$ ad K , erit vt C ad $B E$, ita Q ad K : Item quia, per constructionem, vt C ad G , ita $B M$ ad H , erit vt C ad $B M$, ita G ad H :
sed.

sed ut G ad H , ita facta est Q ad M , erit igitur Q ad M , ut C ad $B M$; & quia, ut C ad $B E$, ita Q ad K , erit M ad K , ut $B M$ ad $B E$; sed $B M$ ad $B E$ habet maiorem rationem, quam Q ad G ; ergo M ad K habebit maiorem rationem, quam Q ad G ; sed quia, ut G ad H , ita Q ad M , erit per rationem perturbatam ratio Q ad K maior, quam Q ad H : ergo H superat K , quod erat probandum.

PROPOSITIO IX. ZETETICA.

Inuenire maximum plano solidum, quod possit applicari dato solido deficiens quadrato cubo.

SIT datum B solidum, & oporteat facere, quod imperatum est; ita erit secandum B solidum; ut si alterum ipsius segmentum effingatur in cubum, quod sit ex reliquo solidi in quadratum huius effecti cubi sit maximum omnium eorum, quæ fieri possint si quomodocunque aliter secetur solidum datum.

Sit igitur segmentum A cubus, erit reliquum B solidum minus A cubo, quod ductum in A quadratum producet plano solidum applicatum B solido in A quadratum minus A quadrato cubo.

Sit secundo segmentum cubus ex A plus E , & E æquetur nihilo, idest cubus ex A plus triplici solido ex A quadrato in E plus triplici solido ex E quadrato in A plus cubo ex E ; erit reliquum B solidum minus cubo ex A minus triplici solido ex A quadrato in E
minus

minus triplici solido ex E quadrato in A minus E cubo, quod ductum in quadratum ex A plus duplici facto ex A in E plus E quadrato producet factum ex B solido in A quadratum plus duplici facto ex B solido in A in E plus facto ex B solido in E quadratum minus A quadrato cubo minus quintuplo facto ex A quadrato quadrato in E minus decuplo facto ex A cubo in E quadratum minus decuplo facto ex E cubo in A quadratum minus quintuplo facto ex A in E quadrato quadratum minus E quadrato cubo.

Vnde si detrahatur prius factum ex B solido in A quadratum minus A quadrato cubo, & reliquum applicetur ad E, & reiectis ijs, quæ ex E non liberantur, fiat Antithesis; erit duplex factum ex B solido in A æquale quintuplo quadrato quadrato ex A, & si omnia applicentur quinque A, etiam A cubus æquabitur duabus ex quinque partibus B solidi; sed cum ex A cubo efformari debeat A quadrato cubus, erit plano solidum applicatum dato solido deficiens quadrato cubo id, quod applicabitur reliquis tribus ex quinque partibus dati solidi. Hinc

P O R I S M A.

Maximum plano solidum, quod applicatur dato solido deficiens quadrato cubo est id, quod applicatur tribus ex quinque partibus dati solidi, & quadrato cubus, qui deficit occupat reliquas duas partes.


V

THEO.

T H E O R E M A.

Omnium plano solidorum ad idem solidum applicatorum, & deficientium plano solidis similibus, similiterque positis maximum est, id quod tribus ex quinque partibus dati solidi applicatur.

SIT datum solidum ex A B in D I in D G; quinta autem pars ipsius A B sit A C, & A D ipsius A C sit dupla; erit B D æqualis tribus ex quinque partibus totius A B; & factum ex B D in D I in D G erit æquale tribus ex quinque partibus dati solidi; fiat solido ex A B in D I in D G æquale solidum ex A Q in E L in E F, & factum ex E A in E L in E F sit simile facto ex A D in D G in D I;



& EF ad DH habeat triplicatam rationem eius, quam habet EF ad DG, seu rationis AE ad AD; erunt parallelepipeda ex AD in DI in DH, & ex AE in EF in EL plano solida similia, similiterque posita; & parallelepipeda ex BD in DH in DI, & ex QE in EF in EL erunt plano solida eidem solido applicata deficientia plano solidis similibus, similiterque positis.

Plano

Plano solidum verò ex B D in D H in D I erit applicatum tribus ex quinque partibus dati solidi, & plano solidum ex Q E in E F in E L erit applicatum parti maiori, quam sint tres ex quinque partibus dati solidi. Quare

Dico primo plano solidum ex B D in D H in D I superare plano solidum ex Q E in E F in E L.

Analyfis primæ partis.

Quia plano solidum ex B D in D H in D I supponitur superare plano solidum ex Q E in E F in E L; habebit factum ex B D in D I ad factum ex Q E in E L maiorem rationem, quam E F ad D H; idest per constructionem, quam cubus ex E F ad cubum ex D G; igitur factum ex B D in D I in cubum ex D G superabit factum ex Q E in E L in cubum ex E F; factum igitur ex B D in D I in D G ad factum ex Q E in E L in E F habebit maiorem rationem, quam quadratum ex E F ad quadratum ex D G; sed quia factum ex A Q in E L in E F est æquale facto ex A B in D I in D G, erit factum ex Q E in E L in E F æquale facto ex A B in D I in D G minus facto ex A E in E L in E F; Quamobrem factum ex B D in D I in D G ad factum ex A B in D I in D G minus facto ex A E in E L in E F habebit maiorem rationem, quam quadratum ex E F ad quadratum ex D G; idcirco factum ex B D in D I in D G cubum superabit factum ex A B in D I in D G in E F quadratum minus facto ex A E in E L in E F cubum; & per Antithesim factum ex A E in E L in E F cubum

quam A E quadratum ad quadratum A D ; ergo factum ex A D quadrato quadrato in B D superabit factum ex A D quadrato in A B in A E quadratum minus quadrato cubo ex A E ; & si fiat interpretatio, ut A D sit æqualis duplæ A C , & B D triplæ A C , & A B quintuplæ A C , & A E duplæ A C minus D E . Quadraginta , & octo quadrato cubi ex A C superabunt quadraginta , & octo quadrato cubos ex A C minus facto ex sexaginta cubis ex A C in D E quadratum plus facto ex quadraginta quadratis ex A C in D E cubum minus facto ex decupla A C in D E quadrato quadratum plus quadrato cubo ex D E ; & si fiat Antithesis erit factum ex sexaginta cubis ex A C in D E quadratum plus facto ex decupla A C in D E quadrato quadratum maius facto ex quadraginta quadratis ex A C in D E cubum plus D E quadrato cubo ; & si omnia applicentur ad D E quadratum, sexaginta cubi ex A C , vna cum facto ex decupla A C in D E quadratum superabunt factum ex quadraginta quadratis ex A C in D E plus D E cubo ; Quod patet ex sequenti lemmate .

L E M M A .

Si fuerint duæ rectæ , & alterius dupla superet alteram . Dico sexaginta cubos ex prima, vna cum facto ex decupla prima in quadratum secundæ superare factum ex quadraginta quadratis primæ in secundâ , plus cubo secundæ .



Int duæ rectæ C, & E, & dupla $\frac{C}{E}$
C superet E. Dico sexaginta $\frac{C}{E}$
cubos

cubos ex C , vna cum facto ex decupla C in E quadratum superare factum ex quadraginta quadratis ex C in E plus E cubo.

Aut enim E deficit à C , aut est æqualis, aut maior; si deficiat, aut sit æqualis patet propositio; nam semper factum ex quadraginta quadratis ex C in E plus E cubo non excedet summam quadraginta vnus cubi ex C ; ergo deficiet à sexaginta cubis ex C plus facto ex decupla C in E quadratum.

Sit vltimo E maior C , sed minor dupla C , & supponatur E æqualis C plus A , & C superare A ; erit E quadratum æquale quadrato ex C plus duplici facto ex C in A plus A quadrato, & cubus ex E erit æqualis cubo ex C plus triplici facto ex C quadrato in A plus triplici facto ex A quadrato in C plus C cubo, & factum ex quadraginta quadratis ex C in E erit æquale quadraginta cubis ex C plus facto ex quadraginta quadratis ex C in A ; & idcirco sexaginta cubi ex C , vna cum facto ex decupla C in E quadratum æquabuntur septuaginta cubis ex C plus facto ex viginti quadratis ex C in A plus facto ex decupla C in A quadratum; factum verò ex quadraginta quadratis ex C in E , vna cum E cubo erit æquale quadraginta, & vni cubo ex C plus facto ex quadraginta tribus quadratis ex C in A plus facto ex tribus quadratis ex A in C plus A cubo; Et si comparentur septuaginta cubi ex C plus facto ex viginti quadratis ex C in A plus facto ex decupla C in A quadratum cum quadraginta, & vno cubo ex C plus facto ex quadraginta tribus quadratis ex C in A plus facto ex tribus quadratis ex A in C plus A cubo;

& si

& si utrinque demantur communia, remanebunt ex altera parte viginti nouem cubi ex C, vna cum facto ex septem C in A quadratum; & ex altera factum ex viginti tribus quadratis ex C in A plus A cubo; idest, quia A superat C, minus, quam viginti quatuor cubi ex C; ergo multo minus, quam viginti nouem cubi ex C, vna cum facto ex septem C in A quadratum; ergo sexaginta cubi ex C, vna cum facto ex decupla C in E quadratum superant factum ex quadraginta quadratis ex C in E plus E cubo; ideò sit

Synthesis primæ partis.

Quia dupla A C superat D E, per lemma superiorius, sexaginta cubi ex A C, vna cum facto ex decupla A C in D E quadratum superabunt factum ex quadraginta quadratis ex A C in D E plus D E cubo; & si omnia ducantur in D E quadratum, factum ex sexaginta cubis ex A C in D E quadratum, vna cum facto ex decupla A C in D E quadrato quadratum superabit factum ex quadraginta quadratis ex A C in D E cubum plus D E quadrato cubo; si utrique parti addantur quadraginta, & octo quadrato cubi ex A C; aggregatum ex quadraginta, & octo quadrato cubis ex A C plus facto ex sexaginta cubis ex A C in D E quadratum plus facto ex decupla A C in D E quadrato quadratum superabit aggregatum ex quadraginta, & octo quadrato cubis ex A C plus facto ex quadraginta quadratis ex A C in D E cubum plus D E quadrato cubo; & facta Antithesi quadraginta, & octo quadrato cubi ex A C superabunt quadraginta, & octo qua-

quadrato cubos ex A C minus facto ex sexaginta cubis
 ex A C in D E quadratum plus facto ex quadraginta
 quadratis ex A C in D E cubum minus facto ex de-
 cupla A C in D E quadrato quadratum plus quadrato
 cubo ex D E ; idest (facta interpretatione, ut A D sit
 æqualis duplæ A C, & B D triplæ A C, & A B
 quintuplæ A C, & A E duplæ A C minus C E)
 factum ex A D quadrato quadrato in B D superabit
 factum ex A D quadrato in A B in A E quadratum
 minus quadrato cubo ex A E . Quamobrem factum ex
 A D quadrato in B D ad factum ex A D quadrato in
 A B minus cubo ex A E habebit maiorem rationem,
 quam quadratum ex A E ad quadratum ex A D, idest,
 quam E F quadratum ad quadratum D G ; factum
 igitur ex A D quadrato in B D in D G quadratum
 superabit factum ex A D quadrato in A B in E F qua-
 dratum minus facto ex A E cubo in E F quadratum;
 & per Antithesim factum ex A E cubo in E F qua-
 dratum superabit factum ex A D quadrato in A B in
 E F quadratum minus facto ex A D quadrato in B D
 in D G quadratum ; & factum ex A E quadrato in E F
 quadratum ad factum ex A D in A B in E F quadra-
 tum minus facto ex A D in B D in D G quadratum
 habebit maiorem rationem, quam A D ad A E, idest,
 quam D I ad E L, & factum ex A E quadrato in E F
 quadratum in E L superabit factum ex A D in A B in
 D I in E F quadratum minus facto ex A D in B D in
 D I in D G quadratum ; Quare factum ex A E in E F
 quadratum in E L ad factum ex A B in D I in E F
 quadratum minus facto ex B D in D I in D G qua-
 dratum

dratum habebit maiorem rationem, quam AD ad AE,
 idest, quam DG ad EF; & factum ex AE in EL
 in EF cubum superabit factum ex AB in DI in DG
 in EF quadratum minus facto ex BD in DI in DG
 cubum; & per Antithesim, factum ex BD in DI in
 DG cubum superabit factum ex AB in DI in DG
 in EF quadratum minus facto ex AE in EL in EF
 cubum; Quamobrem factum ex BD in DI in DG
 ad factum ex AB in DI in DG minus facto ex AE
 in EL in EF habebit maiorem rationem, quam EF
 quadratum ad quadratum DG; sed quia factum ex
 AB in DI in DG est æquale facto ex AQ in EL
 in EF, erit factum ex AB in DI in DG minus facto
 ex AE in EL in EF æquale facto ex QE in EL in
 EF; ergo factum ex BD in DI in DG ad factum
 ex QE in EL in EF habebit maiorem rationem,
 quam EF quadratum ad quadratum DG; & factum
 ex BD in DI in DG cubum superabit factum ex
 QE in EL in EF cubum. Quare factum ex BD in
 DI ad factum ex QE in EL habebit maiorem ratio-
 nem, quam EF cubus ad cubum DG, sed EF cu-
 bus ad cubum DG, per constructionem, est vt EF ad
 DH; Ergo factum ex BD in DI in DH superabit
 factum ex QE in EL in EF, idest plano solidum ap-
 plicatum tribus ex quinque partibus dati solidi supera-
 bit plano solidum applicatum parti maiori, quam sint
 tres ex quinque partibus dati solidi cum simili defectu,
 quod sumpsimus primo loco demonstrandum.


Sit secundo datum solidum ex AB in DI in DG;
 quinta autem pars ipsius AB sit AC, & AD ipsius

AA

X

AC

A C fit dupla, erit B D æqualis tribus ex quinque partibus totius AB; & factum ex BD in DI in DG erit æquale tribus ex quinque partibus dati solidi. Fiat solido AB in DI in DG æquale solidum ex AQ in EL in EF, & factum ex EA in EL in EF fit simile facto ex AD in DG in DI, & DG ad EH habeat triplicatam rationem eius, quam habet DG ad EF, seu rationis AD ad AE; erunt parallelepipeda ex




Analyſis ſecundæ partis .

Quia plano ſolidum ex B D in D G in D I ſupponitur ſuperare plano ſolidum ex Q E in E H in E L ; habebit factum ex B D in D I ad factum ex Q E in E L maiorem rationem, quam E H ad D G ; ideſt per conſtructionem, quam habet cubus ex E F ad cubum ex D G ; igitur factum ex B D in D I in cubum ex D G ſuperat factum ex Q E in E L in cubum ex E F ; factum igitur ex B D in D I in D G ad factum ex Q E in E L in E F habet maiorem rationem, quam quadratum ex E F ad quadratum ex D G ; ſed quia factum ex A Q in E L in E F eſt æquale facto ex A B in D I in D G, erit factum ex Q E in E L in E F æquale facto ex A B in D I in D G minus facto ex A E in E L in E F : Quamobrem factum ex B D in D I in D G ad factum ex A B in D I in D G minus facto ex A E in E L in E F habebit maiorem rationem, quam quadratum ex E F ad quadratum ex D G ; idcirco factum ex B D in D I in D G cubum ſuperabit factum ex A B in D I in D G in E F quadratum minus facto ex A E in E L in E F cubum ; & per Antithetiſm, factum ex A E in E L in E F cubum ſuperabit factum ex A B in D I in D G in E F quadratum minus facto ex B D in D I in D G cubum ; & factum ex A E in E L in E F quadratum ad factum ex A B in D I in E F quadratum minus facto ex B D in D I in D G quadratum habebit maiorem rationem, quam D G ad E F, ideſt quam A D ad A E ; ergo factum ex A E quadrato in E L in E F quadratum ſuperabit

X 2

factum

factum ex A D in D I. in A B in E F quadratum minus facto ex A D in B D in D I in D G quadratum; & factum ex A E quadrato in E F quadratum ad factum ex A D in A B in E F quadratum minus facto ex A D in B D in D G quadratum habebit maiorem rationem, quam D I ad E L, idest A D ad A E; ergo factum ex A E cubo in E F quadratum superabit factum ex A D quadrato in A B in E F quadratum minus facto ex A D quadrato in B D in D G quadratum; & facta Antithesi, erit factum ex A D quadrato in B D in D G quadratum maius facto ex A D quadrato in



dratum; & factum ex A D quadrato in B D ad factum ex A D quadrato in A B minus cubo ex A E habebit maiorem rationem, quam E F quadratum ad quadratum D G, idest, quam A E quadratum ad quadratum A D; ergo factum ex A D quadrato quadrato in B D superabit factum ex A D quadrato in A B in A E quadratum minus quadrato cubo ex A E; & per Antithesim quadrato cubus ex A E superabit factum ex A D quadrato in A B in A E quadratum minus facto ex A D quadrato quadrato in B D; Et si fiat interpret-

pretatio, ut $A E$ sit æqualis duplici $A C$ plus $D E$,
 & $A D$ sit æqualis duplici $A C$, & $D B$ triplici $A C$,
 & $A B$ quintuplæ $A C$; aggregatum ex triginta duo-
 bus quadrato cubis ex $A C$ plus facto ex octoginta
 quadrato quadratis ex $A C$ in $D E$ plus facto ex octo-
 ginta cubis ex $A C$ in $D E$ quadratum plus facto ex
 quadraginta cubis ex $D E$ in $A C$ quadratum plus
 facto ex decupla $A C$ in $D E$ quadrato quadratum
 plus quadrato cubo ex $D E$ superabit aggregatum ex
 triginta duobus quadrato cubis ex $A C$ plus facto ex
 octoginta quadrato quadratis ex $A C$ in $D E$ plus fa-
 cto ex viginti cubis ex $A C$ in $D E$ quadratum, quod
 patet. Quare sit

Synthesis secundæ partis.

Quia aggregatum ex triginta duobus quadrato cu-
 bis ex $A C$ plus facto ex octoginta quadrato
 quadratis ex $A C$ in $D E$ plus facto ex octoginta cu-
 bis ex $A C$ in $D E$ quadratum plus facto ex quadra-
 ginta cubis ex $D E$ in $A C$ plus facto ex decupla $A C$
 in $D E$ quadrato quadratum plus quadrato cubo ex
 $D E$ superat aggregatum ex triginta duobus quadrato
 cubis ex $A C$ plus facto ex octoginta quadrato qua-
 dratis ex $A C$ in $D E$ plus facto ex viginti cubis ex
 $A C$ in $D E$ quadratum; & si fiat interpretatio, ut
 $A E$ sit æqualis duplici $A C$ plus $D E$, & $A D$ sit
 æqualis duplici $A C$, & $D B$ triplici $A C$, & $A B$
 quintuplici $A C$; quadrato cubus ex $A E$ superabit
 factum ex $A D$ quadrato in $A B$ in $A E$ quadratum
 minus facto ex $A D$ quadrato quadrato in $B D$; &
 facta

facta Antithesi, factum ex A D quadrato quadrato in B D superabit factum ex A D quadrato in A B in A E quadratum minus quadrato cubo ex A E. Quare factum ex A D quadrato in B D ad factum ex A D quadrato in A B minus cubo ex A E habebit maiorem rationem, quam quadratum ex A E ad quadratum ex A D, idest quam E F quadratum ad quadratum D G, & factum ex A D quadrato in B D in D G quadratum superabit factum ex A D quadrato in A B in E F quadratum minus facto ex cubo A E in E F quadratum; & per Antithesim, factum ex cubo A E in E F quadratum superabit factum ex A D quadrato in A B in E F quadratum minus facto ex A D quadrato in B D in D G quadratum; & factum ex quadrato A E in E F quadratum ad factum ex A D in A B in E F quadratum minus facto ex A D in B D in D G quadratum habebit maiorem rationem, quam A D ad A E, idest quam D I ad E L; ergo factum ex A E quadrato in E F quadratum in E L superabit factum ex A D in D I in A B in E F quadratum minus facto ex A D in B D in D I in D G quadratum; & factum ex A E in E L in E F quadratum ad factum ex A B in D I in E F quadratum minus facto ex B D in D I in D G quadratum habebit maiorem rationem, quam A D ad A E, idest D G ad E F; & factum ex A E in E L in E F cubum superabit factum ex A B in D I in E F quadratum in D G minus facto ex B D in D I in D G cubum; & per Antithesim, factum ex B D in D I in D G cubum superabit factum ex A B in D I in E F quadratum in D G minus facto ex A E in

in

in EL in EF cubum; & factum ex BD in DI in DG ad factum ex AB in DI in DG minus facto ex AE in EL in EF habebit maiorem rationem, quam EF quadratum ad DG quadratum; sed quia factum ex AQ in EL in EF est æquale facto ex AB in DI in DG , erit factum ex AB in DI in DG minus facto ex AE in EL in EF æquale facto ex QE in EL in EF : Quare factum ex BD in DI in DG ad factum ex QE in EL in EF habebit maiorem rationem, quam EF quadratum ad DG quadratum; & factum ex BD in DI in DG cubum superabit factum ex QE in EL in EF cubum: Quamobrem factum ex BD in DI ad factum ex QE in EL habebit maiorem rationem, quam EF cubus ad cubum DG ; sed, ut EF cubus ad cubum DG , ita est ex constructione EH ad DG ; ergo factum ex BD in DI ad factum ex QE in EL habebit maiorem rationem, quam EH ad DG ; & factum ex BD in DI in DG superabit factum ex QE in EL in EH , idest plano solidum applicatum tribus ex quinque partibus dati solidi superabit plano solidum applicatum parti minori, quam sint tres ex quinque partibus dati solidi simili existente defectu; cum verò etiam demonstratum sit superare id, quod est applicatum parti maiori, quam sint tres ex quinque partibus dati solidi, hinc patet esse omnium maximum, quod erat demonstrandum.

SCHO-


Si dentur due lineæ, quarum altera gerat vicem rationalis, altera verò possit datum solidum, & queratur quarta proportionalis posita rationali prima, & ea, que potest datum solidum secunda, quarta inuenta erit similis dato solido, cuius segmenta similia erunt segmentis dati solidi, & prima duarum medio loco proportiondium inter rationalem, & segmentum similis dato solido erit similis ei, que potest cubum equalem segmento dati solidi; secunda verò duarum medio loco proportionalium inter rationalem, & segmentum similis dato solido erit similis quadrato eius, que potest cubum equalem segmento dati solidi, & rationalis ad hanc habebit rationem subsequeplicitam eius rationis, quam habet ad similem segmento dati solidi; & si fiat ut rationalis ad hanc, ita similis reliquo segmento dati solidi ad aliam, erit hæc ultimo loco inuenta similis plano solido applicato dato solido cum defectu quadrato cubi; Quare in id recidet questio, ut data rationali, & simili dato solido similis dato solido ita secetur, ut si fiat alterum segmentum similis dato solido ad aliam in ratione subsequeplicita rationis, quam habet rationalis ad alterum segmentum hæc sit omnium maxima. Hinc fit ut eadem superior propositio per lineas homologas data rationali apte proponatur, & demonstretur sequenti propositione; Ideo sit

Eadem propositio proposita, & demonstrata per lineas homologas data rationali.

Datis duabus rectis lineis, quarum altera non
secta se habeat loco rationalis; altera verò
secta

secta sit utcumque, & alterum ipsius segmen-
tum habeat ad aliam rectam lineam ratio-
nem subsesquiplicatam eius, quam habet
non secta ad alterum segmentum. Dico
hanc fore omnium maximam, quando seg-
mentum, ad quod refertur non secta erit
æquale duabus ex quinque partibus datae
rectæ, vel fuerit subsesquialterum alterius
segmenti.

SIT data rationalis C, & altera A B, quæ prius



fecetur in M; ita, ut A M sit subsesquialtera ipsius
M B; secundo, utcumq; in E; ita ut B E sit maior,
aut minor ipsa B M, & inter C, & A M supponantur
duæ mediæ proportionales F, & G; ita, ut sint con-
tinuè proportionales C, & F, & G, & A M; ut autem
C ad G; ita fiat B M ad H. Quia C ad G habet
rationem subsesquiplicatam eius, quam habet ad A M,
habebit B M ad H rationem subsesquiplicatam eius,
quam habet C ad A M.

Supponantur iterum inter C, & A E duæ mediæ
proportionales I, & Q; ita ut sint continuè propor-
tionales
Y rationales

tionales C, & I, & Q, & A E; vt autem C ad Q, ita fiat B E ad K, habebit C ad Q subsesquiplicatam rationem eius, quam habet C ad A E; Quare B E ad K habebit rationem subsesquiplicatam eius, quam habet C ad A E; & quia A M est subsesquialtera ipsius B M. Dico H superare K.

Fiat vt G ad H, ita Q ad M, & considerentur tres quantitates Q, & G, & H; item aliæ tres Q, & M, & K, erit ratio Q ad H composita ex ratione Q ad G, & G ad H; ratio vero Q ad K erit composita ex ratione Q ad M, & M ad K; & quia ab eadem C sunt duæ series continuè proportionalium C, & F, & G, & A M, item C, & I, & Q, & A E, habebit Q ad G subsesquiplicatam rationem eius, quam habet A E ad A M; Quia autem, vt C ad Q, ita facta est B E ad K, erit vt C ad B E, ita Q ad K; item quia, vt C ad G, ita facta est B M ad H erit, vt C ad B M, ita G ad H; sed vt G ad H, ita Q ad M; ergo Q ad M erit, vt C ad B M, & vt Q ad K, ita C ad B E; ergo M ad K erit, vt B M ad B E: sed per lemma decimum tertium, B M ad B E habet maiorem rationem, quam sit ratio subsesquuplicata A E ad A M, idest quam sit ratio Q ad G, & G ad H habet eandem rationem, quam habet Q ad M; ergo per Analogiam perturbatam Q ad K habebit maiorem rationem, quam Q ad H, ergo H superat K, quod erat demonstrandum.

PRO-

PROPOSITIO X. ZETETICA.

Inuenire maximum plano solidum, quod possit
applicari dato plano plano deficiens
quadrato cubo.



IT datum B plano planum, & oporteat fa-
cere, quod imperatum est; ita erit secundum
B plano planum; ut si ex altero ipsius segmen-
to efficiatur quadrato quadratum, quod sit ex reliquo
plano plani in latus dicti quadrato quadrati sit maximum
omnium eorum, quæ fieri possint, si quomodocunque
aliter secetur plano planum datum.

Sit igitur primo segmentum A quadrato quadratum,
erit reliquum B plano planum minus A quadrato qua-
drato, quod ductum in A producet plano solidum ap-
plicatum B plano planum in A minus A quadrato cubo.

Sit secundo segmentum quadrato quadratum ex A
plus E, & E æquetur nihilo; idest quadrato quadra-
tum ex A plus quadruplo plano plano ex A cubo in E
plus sextuplo plano plano ex A quadrato in E quadra-
tum plus quadruplo plano plano ex A in E cubum plus
E quadrato quadrato; erit reliquum B plano planum
minus A quadrato quadrato minus quadruplo plano
plano ex A cubo in E minus sextuplo plano plano ex A
quadrato in E quadratum minus quadruplo plano plano
ex A in E cubum minus E quadrato quadrato; quod
ductum in A, plus E producet factum ex B plano
plano in A plus facto ex B plano plano in E minus
quadrato cubo ex A minus facto ex quintuplo A qua-
drato

drato quadrato in E minus facto ex decuplo A cubo in E quadratum minus facto ex decuplo A quadrato in E cubum minus quintuplo facto ex A in E quadrato quadratum minus E quadrato cubo . Vnde si detrahatur prius factum ex B plano plano in A minus A quadrato cubo, & reliquum applicetur ad E, & reiectis ijs, quæ ex E non liberantur, fiat reliqui Antithesis; erit quintuplum A quadrato quadratum æquale B plano plano; & si utraq; pars quintupartiat, erit A quadrato quadratum æquale quintæ parti B plano plani; & cum ex A quadrato quadrato effingi debeat quadrato cubus, erit plano solidum applicatum dato plano plano deficiens quadrato cubo id, quod applicatur reliquis quatuor ex quinque partibus dati plano plani . Hinc

P O R I S M A.

Maximum plano solidum, quod applicatur dato plano plano deficiens quadrato cubo est id, quod applicatur quatuor ex quinque partibus dati plano plani, & quadrato cubus, qui deficit occupat reliquam quintam partem .

T H E O R E M A.

Omnium plano solidorum ad idem plano planum applicatorum & deficientium plano solidis similibus, similiterq; positis maximum est id, quod quatuor ex quinque partibus dati solidi applicatur.

SIT primo datum parallelepipedum ex A B, in D I, in D G datum plano planum, & quinta pars ipsius A B sit A D, erit B D æqualis quatuor

quatuor ex quinque partibus totius $A B$, & factum ex $B D$ in $D I$ in $D G$ erit æquale quatuor ex quinque partibus dati parallelepipedo; fiat parallelepipedo ex $A B$ in $D I$ in $D G$ æquale parallelepipedum ex $A Q$ in $E L$ in $E F$, ea lege, ut factum ex $E A$ in $E L$ sit simile facto ex $A D$ in $D I$; sed $E F$ ad $D G$ habeat duplicatam rationem eius, quam habet $A E$ ad $A D$, erunt parallelepipeda ex $A E$ in $E F$ in $E L$, & ex $A D$ in $D I$ in $D G$ plano plana similia; fiat iterum, ut $A E$ ad $A D$, ita $D G$ ad $D H$, erunt parallelepipeda ex $A E$ in $E F$ in $E L$, & ex $A D$ in $D H$ in $D I$ plano solida similia, similiterq; posita; & parallelepipeda ex $D B$ in $D I$ in $D H$, & ex $E Q$ in $E L$ in $E F$ erunt plano solida eidem plano applicata deficientia plano solidis similibus, similiterq; positis; & parallelepipedum ex $D B$ in $D I$ in $D H$ erit applicatum quatuor ex quinque partibus dati plano plani; parallelepipedum verò ex $E Q$ in $E L$ in $E F$ erit applicatum parti maiori, quam sint quatuor ex quinque partibus dati plano plani simili existente defectu. Dico primo plano solidum ex $D B$ in $D I$ in $D H$ superare plano solidum ex $E Q$ in $E L$ in $E F$.

Analysys primæ partis.

Quia plano solidum ex $D B$ in $D I$ in $D H$ superponitur superare plano solidum ex $E Q$ in $E L$ in $E F$, habebit factum ex $B D$ in $D I$ ad factum ex $Q E$ in $E L$ maiorem rationem, quam $E F$ ad $D H$; idest, per constructionem, quam cubus ex $A E$ ad cubum ex $A D$; sed cubus ex $A E$ est id, quod fit ex

$A E$

A E quadrato in A E, & cubus ex A D est id, quod fit ex A D quadrato in A D, &, vt A E quadratum ad A D quadratum, ita E F ad D G; ergo vt cubus ex A E ad cubum ex A D, ita erit factum ex A E in E F ad factum ex A D in D G; Quare factum ex B D in D I ad factum ex Q E in E L habebit maiorem rationem, quam factum ex A E in E F ad factum ex A D in D G; ergo factum ex B D in D I in A D in D G superabit factum ex Q E in E L in A E in E F; sed, quia per constructionem factum ex A Q in E L in E F est æquale facto ex A B in D I in D G, erit factum ex Q E in E L in E F æquale facto ex A B in D I in D G minus facto ex A E in E L in E F;



quare, facta interpretatione, factum ex B D in D I in A D in D G superabit factum ex A B in D I in D G in A E minus facto ex A E quadrato in E L in E F; & facta Antithesi, factum ex A E quadrato in E L in E F superabit factum ex A B in D I in D G in A E minus facto ex B D in D I in A D in D G, & factum ex A E quadrato in E L ad factum ex A B in D I in A E minus facto ex B D in D I in A D habebit maiorem rationem, quam D G ad A F, idest, quam A D quadratum ad A E quadratum per constructionem; ergo factum ex A E quadrato quadrato in E L superabit factum ex A B in D I in A E in A D quadratum minus facto ex B D in D I


in

in A D cubum, & A E quadrato quadratum ad factum ex A B in A E in A D quadratum minus facto ex B D in A D cubum habebit maiorem rationem, quam D I ad E L, idest, quam A D ad A E; & A E quadrato cubus superabit factum ex A B in A E in A D cubum minus facto ex B D in A D quadrato quadratum. Fiat interpretatio, vt A E sit æqualis A D minus D E, & A B sit æqualis quintuplæ A D, & B D sit æqualis quadruplæ A D; erit quadrato cubus ex A E æqualis quadrato cubo ex A D minus quintuplo plano solido ex A D quadrato quadrato in D E plus decuplo plano solido ex A D cubo in D E quadratum minus decuplo plano solido ex A D quadrato in D E cubum plus quintuplo plano solido ex A D in D E quadrato quadratum minus D E quadrato cubo, & factum ex A B in A E in A D cubum minus facto ex B D in A D quadrato quadratum erit æquale A D quadrato cubo minus quintuplo plano solido ex A D quadrato quadrato in D E; ergo aggregatum ex quadrato cubo ex A D minus quintuplo plano solido ex A D quadrato quadrato in D E plus decuplo plano solido ex A D cubo in D E quadratum minus decuplo plano solido ex A D quadrato in D E cubum plus quintuplo plano solido ex A D in D E quadrato quadratum minus D E quadrato cubo superabit A D quadrato cubum minus quintuplo plano solido ex A D quadrato quadrato in D E; & si fiat Antithesis, & demantur communia, decuplum plano solidum ex A D cubo in D E quadratum plus quintuplo plano solido ex A D in D E quadrato quadratum superabit

perabit decuplum plano solidum ex A D quadrato in D E cubum plus D E quadrato cubo. Vtraq; pars applicetur ad D E quadratum; decuplus cubus ex A D plus quintuplo solido ex A D in D E quadratum superabit decuplum solidum ex A D quadrato in D E plus D E cubo, quod patet, quia A D superat D E; Quare sit

Synthesis primæ partis.

Quia A D superat D E decuplus cubus ex A D plus quintuplo solido ex A D in D E quadratum superabit decuplum solidum ex A D quadrato in D E plus cubo ex D E; &, si vtraq; pars ducatur in D E quadratum; decuplum plano solidum ex A D cubo



in D E quadratum plus quintuplo plano solidum ex A D in D E quadrato quadratum superabit decuplum plano solidum ex A D quadrato in D E cubum plus D E quadrato cubo; si vtriq; parti addatur A D quadrato cubus minus quintuplo plano solido ex A D quadrato quadrato in D E; aggregatum ex quadrato cubo ex A D minus quintuplo plano solido ex A D quadrato quadrato in D E plus decuplo plano solido ex A D cubo in D E quadratum plus quintuplo plano solido ex A D in D E quadrato quadratum superabit aggregatum ex A D quadrato cubo minus quintuplo plano solido ex A D quadrato quadrato in D E plus decuplo plano solido ex A D quadrato

drato

drato in D E cubum plus D E quadrato cubo ; & per
 Antithesim , aggregatum ex quadrato cubo ex A D
 minus quintuplo plano solido ex A D quadrato qua-
 drato in D E plus decuplo plano solido ex A D cubo
 in D E quadratum minus decuplo plano solido ex A D
 quadrato in D E cubum plus quintuplo plano solido
 ex A D in D E quadrato quadratum minus D E qua-
 drato cubo superabit aggregatum ex A D quadrato
 cubo minus quintuplo plano solido ex A D quadrato
 quadrato in D E ; idest, facta interpretatione, ut A D
 minus D E sit æqualis A E, & quintupla A D sit æqua-
 lis A B, & quadrupla A D sit æqualis B D; Quadrato
 cubus ex A E superabit factum ex A B in A E in A D
 cubum minus facto ex B D in A D quadrato quadratum;
 Quare A E quadrato quadratum ad factum ex A B in
 A E in A D quadratum minus facto ex B D in A D
 cubum habebit maiorem rationem, quam A D ad A E,
 idest quam D I ad E L ; & factum ex A E quadrato
 quadrato in E L superabit factum ex A B in A E in A D
 quadratum in D I minus facto ex B D in A D cubum
 in D I; quare factum ex A E quadrato in E L ad factum
 ex A B in D I in A E minus facto ex B D in D I in A D
 habebit maiorem rationem, quam A D quadratum ad
 A E quadratum, idest, per constructionem, quam D G
 ad E F; & factum ex A E quadrato in E L in E F supe-
 rabit factum ex A B in D I in A E in D G minus facto
 ex B D in D I in A D in D G, & facta Antithesi factum
 ex B D in D I in A D in D G superabit factum ex A B
 in D I in A E in D G minus facto ex A E quadrato in
 E L in E F; sed quia, per constructionem, factum ex A Q

Z

in

in DI ; sed EF ad DG habeat duplicatam rationem eius, quam habet AE ad AD , erunt parallelepipeda ex AE in EF in EL , & ex AD in DI in DG plano plana similia; fiat autem, ut AD ad AE , ita EF ad EH ; erunt parallelepipeda ex AE in EH in EL , & ex AD in DI in DG plana solida similia, similiterq; posita, & parallelepipeda ex BD in DI in DG , & ex EQ in EL in EH erunt plano solida eidem plano applicata deficientia plano solidis similibus, similiterq; positis; & parallelepipedum ex DB in DI in DG erit applicatum quatuor ex quinque partibus dati plano plani; parallelepipedum verò ex EQ in EL in EH erit applicatum parti minori, quam sint quatuor ex quinque partibus dati plano plani simili existente defectu. Dico secundo plano solidum ex BD in DI in DG superare plano solidum ex EQ in EL in EH .


Analysís secundæ partis.

Quia plano solidum ex BD in DI in DG supponitur superare plano solidum ex EQ in EL in EH , habebit factum ex BD in DI ad factum ex QE in EL maiorem rationem, quam EH ad DG , idest per constructionem, quam cubus ex AE ad cubum ex AD ; sed cubus ex AE ad cubum ex AD habet rationem compositam ex AE ad AD , & ex quadrato AE ad quadratum AD , idest EF ad DG ; sed rationem compositam ex AE ad AD , & EF ad DG habet etiam factum ex AE in EF ad factum ex AD in DG ; ergo factum ex BD in DI ad factum ex QE in EL habet maiorem rationem, quam factum ex AE in EF ad factum ex AD in DG ;

$Z \quad 2$

DG ;

DG; ergo factum ex BD in DI in AD in DG superabit factum ex QE in EL in AE in EF; sed quia per constructionem factum ex AQ in EL in EF est æquale facto ex AB in DI in DG, erit factum ex QE in EL in EF æquale facto ex AB in DI in DG minus facto ex AE in EL in EF; Quare, facta interpretatione, factum ex BD in DI in AD in DG superabit factum ex AB in DI in DG in AE minus facto ex AE quadrato in EL in EF; & facta Antithesi, factum ex AE quadrato in EL in EF superabit factum ex AB in DI in DG in AE minus facto ex BD in DI in AD in DG; & factum ex AE quadrato in EL ad factum ex AB in DI in AE minus facto



ex BD in DI in AD habebit maiorem rationem, quam DG ad EF; id est, quam AD quadratum ad AE quadratum per constructionem; Ergo

factum ex AE quadrato quadrato in EL superabit factum ex AB in DI in AE in AD quadratum minus facto ex BD in DI in AD cubum; & AE quadrato quadratum ad factum ex AB in AE in AD quadratum minus facto ex BD in AD cubum habebit maiorem rationem, quam DI ad EL; id est, quam AD ad AE; & AE quadrato cubus superabit factum ex AB in AE in AD cubum minus facto ex BD in AD quadrato quadratum. Fiat interpretatio ut AE sit æqualis AD plus DE, & AB sit æqualis quintuplæ AD, & BD sit æqualis quadruplæ AD, erit quadrato cubus ex AE æqualis aggregato ex quadrato cubo ex AD plus quintuplo plano solido ex

AD

A D quadrato quadrato in D E plus decuplo plano solido ex A D cubo, in D E quadratum plus decuplo plano solido ex A D quadrato in D E cubum plus quintuplo plano solido ex A D in D E quadrato quadratum plus D E quadrato cubo, quod aggregatum patet superare aggregatum ex A D quadrato cubo plus quintuplo plano solido ex A D quadrato quadrato in D E, quod per interpretationem æquatur facto ex A B in A E in A D cubum, minus facto ex B D in A D quadrato quadratum; quare patet conclusio. Sit igitur

Synthesis secundæ partis.

Q Via quadrato cubus ex A D plus quintuplo plano solido ex A D quadrato quadrato in D E plus decuplo plano solido ex A D cubo in D E quadratum plus decuplo plano solido ex A D quadrato in D E cubum plus quintuplo plano solido ex A D in D E quadrato quadratum plus D E quadrato cubo superat quadrato cubum ex A D plus quintuplo plano solido ex A D quadrato quadrato in D E; idest, si fiat interpretatio, ut A D plus D E sit æqualis A E, & quintuplæ A D sit æqualis A B; quadruplæ verò A D sit æqualis B D; quia quadrato cubus ex A E superat factum ex A B in A E in A D cubum minus facto ex B D in A D quadrato quadratum; habebit A E quadrato quadratum ad factum ex A B in A E in A D quadratum minus facto ex B D in A D cubum maiorem rationem, quam A D ad A E, idest D I ad E L; & factum ex A E quadrato quadrato in E L superabit factum ex A B in D I in A E in A D quadratum minus facto ex B D in D I in A D cubum; Quare factum

Z 3

ex

ex A E quadrato in E L ad factum ex A B in D I in A E minus facto ex B D in D I in A D habebit maiorem rationem, quam A D quadratum ad A E quadratum; idest per constructionem, quam D G ad E F; & factum ex A E quadrato in E L in E F superabit factum ex A B in D I in A E in D G minus facto ex B D in D I in A D in D G; & per Antithesim, factum ex B D in D I in A D in D G superabit factum ex A B in D I in A E in D G minus facto ex A E quadrato in E L in E F; sed, quia per constructionem, factum ex A B in D I in D G est æquale facto ex A Q in E L in E F; erit factum ex A B in D I in D G minus facto ex A E in E L in E F æquale facto ex Q E in E L in E F; quare si fiat interpretatio, factum ex B D in D I in A D in D G superabit factum ex Q E in E L in E F in A E; ergo factum ex B D in D I ad factum ex Q E in E L habebit maiorem rationem, quam factum ex A E in E F ad factum ex A D in D G, sed factum ex A E in E F ad factum ex A D in D G habet rationem, compositam ex ratione A E ad A D, & E F ad D G; idest quadrati A E ad A D quadratum per constructionem; sed hanc eandem rationem habet cubus ex A E ad cubum ex A D, ergo factum ex B D in D I ad factum ex Q E in E L habebit maiorem rationem, quam A E cubus ad A D cubum, idest, quam E H ad D G; ergo factum ex B D in D I in D G superabit factum ex Q E in E L in E H, idest plano solidum applicatum quatuor ex quinque partibus dati plano plani superabit plano solidum, quod applicatur parti minori, quam sint quatuor ex quinque partibus dati plano plani; cum autem etiam demonstratum sit superare id, quod applicatur parti maiori, quam sint quatuor ex quinque par-

par-

partibus simili existente defectu patet esse omnium maximum eorum, quæ applicari possint, quod proposuimus demonstrandum.

SCHOLIVM.

SI dentur duæ lineæ, quarum altera gerat vicem rationalis, altera verò possit datum plano planum, & queratur quinta proportionalis posita rationali prima, & ea, quæ potest datum plano planum secunda, quinta inuenta erit similis dato plano plano, cuius segmenta similia erunt segmentis dati plano plani, & prima trium medio loco proportionalium inter rationalem, et segmentum similis dato plano plano erit similis ei, quæ potest quadrato quadratum æquale segmento dati plano plani; & si fiat, ut rationalis ad hanc, ita similis reliquo segmento dati plano plani ad aliam, erit hæc ultimo loco inuenta similis plano solido applicato dato plano plano cum defectu quadrato cubi; Quare in id recidet questio, ut data rationali, & simili dato plano plano similis dato plano plano ita sece-
tur, ut si fiat alterum segmentum similis dato plano plano ad aliam in ratione subquadruplicata rationis, quam habet rationalis ad alterum segmentum hæc sit omnium maxima. Hinc eadem superior propositio per lineas homologas data rationali aptè proponitur, & demonstratur sequenti propositione; ideò sit


Eadem propositio proposita, & demonstrata per lineas homologas data rationali.

Datis duabus rectis lineis, quarum altera se habeat loco rationalis, altera verò secta sit utcumque, & alterum ipsius segmentum habeat ad aliam rationem subquadruplicatam eius, quam habet

ra-

rationalis ad alterum segmentum . Hæc erit omnium maxima , quando segmentū , ad quod refertur rationalis fuerit æquale quintæ parti datæ rectæ , vel fuerit subquadruplum alterius segmenti .

SIT data rationalis C , & altera A B , quæ prius secetur in M , vt A M sit quinta pars totius A B , & idè subquadrupla ipsius B M . Secundo vt-
cunque in E ; ita vt B E sit maior , aut minor ipsa B M , & inter C , & A M sint tres medio loco continuè pro-



portionales G , & E & F ; ita vt sint quinque continuè proportionales C , & G , & E , & F , & A M ; vt autem C ad G , ita fiat B M ad H ; quia C ad G habet rationem subquadruplicatam eius , quam habet ad A M habebit B M ad H rationem subquadruplicatam eius , quam habet C ad A M . Supponantur iterum inter C , & A E tres mediæ continuè proportionale Q & I , & R , ita vt sint quinque continuè proportionales C , & Q , & I , & R , & A E ; vt autem C ad Q , ita fiat B E ad K habebit C ad Q subquadruplicatam rationem eius , quam habet C ad A E ; Quare B E ad K habebit rationem subqua-
dru-

druplicatam eius, quam habet C ad $A E$; & quia $A M$ est subquadrupla ipsius $B M$. Dico H superare K . Fiat, ut G ad H , ita Q ad M , & considerentur tres quantitates Q & G , & H , item aliae tres Q & M , & K ; erit ratio Q ad H composita ex ratione Q ad G , & G ad H ; ratio verò Q ad K erit composita ex ratione Q ad M , & M ad K ; & quia ab eadem C sunt duae series continuè proportionalium C , & G , & E , & F , & $A M$, item C , & Q , & I , & R , & $A E$, habebit Q ad G subquadruplicatam rationem eius, quam habet $A E$ ad $A M$, ut colligi potest ex lemmate secundo. Quia verò, ut C ad Q , ita facta est $B E$ ad K , erit ut C ad $B E$, ita Q ad K , item quia, ut C ad G , ita facta est $B M$ ad H , erit, ut C ad $B M$, ita G ad H ; sed, ut G ad H , ita Q ad M ; ergo Q ad M erit, ut C ad $B M$, & ut Q ad K , ita C ad $B E$; ergo M ad K erit, ut $B M$ ad $B E$; sed, per lemma decimum quartum, $B M$ ad $B E$ habet maiorem rationem, quam sit ratio subquadruplicata $A E$ ad $A M$, idest quam sit ratio Q ad G , & G ad H habet eandem rationem, quam habet Q ad M ; ergo per Analogiam perturbatam Q ad K habebit maiorem rationem, quam Q ad H ; ergo H superat K , quod erat demonstrandum.

S C H O L I V M.

IAM expeditae sunt propositiones de applicationibus figurarum deficientium figura data specie usque ad solido solida, ex quibus evidens fit id, quod in Isagogicis diximus gradum figure applicandae denominare multitudinem partium, in quas diuidenda est magnitudo, cui fit applicatio, & gradum magnitudinis, cui fit

fit applicatio numerare partes, quas occupat applicata magnitudo deficiens figura data specie. Et hoc generaliter verum est; possum enim ad solido solida, & ulterius hæ propositiones produci eadem methodo, qua superiores propositiones demonstratæ sunt; Quamobrem earum tantum propositionum, quæ ad solido solida spectant Elenchum subdam.

E L E N C H V S.

Propositionum, quæ spectant ad applicationem solido solidorum datæ magnitudini deficientium solido solido dato specie.

Maximum solido solidum, quod applicari possit datæ lineæ deficiens solido solido dato specie est id, quod sextæ parti datæ lineæ applicatur.

Eadem propositio data rationali per lineas homologas.

Duabus datis rectis lineis, quarum altera sit rationalis non secta, altera verò secta utcumque, & fiat alterum segmentum sectæ ad aliam in ratione quintuplicata eius, quam habet rationalis ad alterum segmentum, hæc erit omnium maxima, quando segmentum, ad quod referatur non secta fuerit alterius quintuplum.

Maximum solido solidum, quod applicari possit dato plano deficiens solido solido dato specie est id, quod applicatur duabus ex sex partibus dati plani, seu tertiæ parti dati plani.

Eadem

Eadem propositio data rationali per
lineas homologas .

Hæc propositio , vt demonstretur per lineas homologas data rationali conuenit cum ea , quæ demonstratur propositione secunda ; nam si dato plano assimiletur linea , erit solido solidum simile solido ; maximum autem solidum , quod applicatur datæ lineæ deficiens solido dato specie esse id , quod applicatur tertiæ parti datæ lineæ docuimus propositione secunda , cui respondet propositio per lineas homologas .

Maximum solido solidum , quod applicatur dato solido deficiens solido solido dato specie est id , quod applicatur tribus ex sex partibus , idest dimidio dati solidi .

Huic respondet per lineas homologas data rationali , ea propositio , quæ respondet propositioni primæ ; nam si solido assimiletur linea , solido solido erit simile planum .

Maximum solido solidum , quod applicatur dato plano plano deficiens solido solido dato specie , est id , quod applicatur quatuor ex sex partibus dati plano plani , idest duabus ex tertijs partibus dati plani .

Huic

00564085

Huic respondet propositio tertia cum sua propositione per lineas homologas ; nam si plano plano assimiletur planum erit solido solidum simile solido, & maximum solidum, quod applicatur plano deficiens solido simili dato demonstratum est propositione tertia esse illud, quod applicatur duabus tertijs partibus dati plani.

Maximum solido solidum, quod applicatur plano solido deficiens solido solido dato specie est id, quod applicatur quinque ex sex partibus dati plano solidi.

Eadem propositio per lineas homologas proponitur.

Datis duabus rectis lineis, quarum altera sit rationalis non secta, altera verò secta utcumque, & alterum ipsius segmentum habeat ad aliam rationem subquintuplicatam eius, quam habet rationalis ad alterum segmentum. Hæc erit omnium maxima, quando segmentum, ad quod refertur rationalis fuerit æquale sextæ parti datæ rectæ, vel fuerit alterius segmenti subquintuplum.

Et constanti hoc ordine procedunt altiorum magnitudinum applicationes in infinitum, & demonstrationes omnibus obviæ erunt, qui superiora intellexerint.

F I N I S.

005663683

